


N^o 5 N^o 7 23




V. 1438

Suite

du Memoire qui a pour devise.


Magnæ molis opus.



carton 5

n^o 7

TISSOT




L'Exercice & le mouvement disposant les facultés animales à bien exécuter leurs fonctions, & facilitant à la nature les moyens de vaincre tous les obstacles qu'elle a à combattre; et celle-ci, lorsqu'elle est attaquée de quelques dérangemens, employant dans l'occasion, pour se soulager, certains mouvemens, tels que la toux, le ris, l'éternuement, &c. D'après cela la Chirurgie peut à l'imitation de la nature tirer parti des différens exercices du corps pour la guérison de la pluspart des maladies chirurgicales.

Les secours, qui se tirent de l'exercice, sont dans toutes leurs circonstances, infiniment au dessus de ceux, qui se tirent des médicamens, les médicamens sont rebutans, & l'exercice est agréable; l'effet de ceux-là est souvent incertain, & l'effet de l'exercice est toujours inmanquable, ceux-là n'agissent pour l'ordinaire que sur les fluides, & encore avant qu'ils aient pénétré, jusques dans le sang, ils subissent tant d'altérations que lorsqu'ils y arrivent, ils ont perdu presque toute leur vertu; et l'exercice porte son action tant sur les parties solides que sur les fluides, & agit immédiatement sur les uns & sur les autres. — Enfin l'exercice est un secours toujours prêt, & qu'on a, pour ainsi dire, sous la main, toutes les fois que l'on veut.

Quoique l'exercice puisse guérir promptement & avec succès, certaines maladies, contre lesquelles les autres secours de la chirurgie seroient inutiles, quoique certains médicamens puissent devenir infructueux sans le secours de l'exercice; néanmoins il est des cas, où l'exercice sans les remèdes pourroit pareillement ne pas opérer avec tout le succès que l'on se promet, aussi est-il quelques fois à propos de joindre l'un & l'autre ensemble, & ils deviennent alors de la plus grande efficacité.

Avant que de parler des maladies chirurgicales, dont la guérison complète, ne cède qu'àux charmes de l'exercice, nous citerons quelques médicamens qui semblent le plus indiquer le secours du mouvement.

L'usage des remèdes astringens tels que le quinquina & les préparations tirées du marc, &c. dont les propriétés sont d'épaissir les fluides auxquels ils se mêlent, de resserrer les pores & les canaux des parties solides, indique le mouvement pour rétablir l'oscillation des fibres, accélérer la circulation, & pour que les particules de ces médicamens soient plutôt



Distribués,

Les exercices du premier genre renfermant en général ceux qui sont les plus violens, ne peuvent être indiqués qu'à ces malades qui ont recouvré leurs forces, & qui se sont déjà accoutumés par degrés à ces sortes d'exercices. Mais lorsqu'on a assez de forces pour en supporter l'action, on peut en espérer du succès; en observant de prendre les précautions nécessaires dont nous avons parlé.

Toutes les fois qu'on a l'indication de donner du mouvement à toutes les parties du corps, mais avec modération: Quoi de plus propre que le jeu du billard, du palet, & des quilles? Ils peuvent satisfaire à d'autres indications encore; par exemple, — lorsqu'il y a roideur ou faiblesse dans les membres, &c, & qu'il faut donner de la force & de la vigueur au corps & aux membres affaiblis; lorsqu'il s'agit de faciliter les mouvemens des articulations, de faire allonger les muscles roidis ou retirés; ainsi le jeu de billard dans l'exercice duquel on met sans cesse en action les bras, les jambes & surtout le bout des pieds, peut être regardé comme salutaire dans ces différens cas. Mais s'il y avait anchilose au bras, dans l'articulation du coude, ou que les muscles fussent roidis, comme cela arrive à la suite des fractures du bras; le jeu du palet, de la boule, seroit bien mieux indiqué que le jeu de billard, pour favoriser les mouvemens bornés de cette partie: car on ne peut jeter la boule, sans employer de la force, & sans que les muscles, qui meuvent l'avant-bras sur le bras, ne se fléchissent & ne s'étendent considérablement.

Le jeu du volant, de la paume, du mail & du ballon pourroient encore satisfaire à ces mêmes indications, mais ils ont d'autres avantages; c'est qu'en exerçant tout le corps assez violemment & surtout les parties inférieures, ils sont propres à rendre le corps plus vigoureux, & à exciter une transpiration abondante; ainsi on pourroit les prescrire dans tous les cas où l'on a indication de séconder l'effet des médicamens sudorifiques, de provoquer la sueur, de débarrasser les glandes cutanées de cette limphe âcre, épaisse, qui empêche la transpiration.

On lit dans les mille et une nuit, contes arabes *, la guérison d'un Prince Grec, qui n'avoit jamais pu se délivrer de la lèpre, quelques remèdes qu'il eût employé; — jusqu'à ce qu'un habile Médecin le guérit par le moyen de l'exercice du jeu du mail.

„ Il eut un mail, dit l'auteur, qu'il creusa en dedans par le manche, où il mit de la
 „ drogue, dont il prétendoit se servir; il accommoda une boule de même, & le lendemain
 „ il dit au Roi: Tenez, Sire, exercez vous avec ce mail & poussez vigoureusement
 „ cette boule, jusqu'à ce que vous sentiez votre main & votre corps en sueur. Cela
 „ fait, le remède opera si bien que le Roi fut guéri de la lèpre. „ Cette historiette n'est pas mal imaginée, sans doute pour insinuer l'utilité de l'exercice en général, & en particulier l'utilité du jeu du mail ou de quelque autre jeu approchant, dans tous les cas où la transpiration seroit rallentie chez différens Sujets; rallentissement qui est le plus souvent la cause du retour de ces maladies cutanées, qui reparaissent au moindre froid, & qui se dissipent dès que l'atmosphère a relâché le tissu de la peau.

* Voyez T. I. p. 137. 2^e Edition de la Haye 1714.



et afin que l'estomach soit par ce moyen plus en état de les supporter. —
L'expérience ne prouve-t-elle pas que leur usage est beaucoup plus sûr & —
plus heureux, quand on fait en même tems usage de l'exercice.

L'indication du mouvement est la même pendant l'usage des ~~balsamiques~~
balsamiques pris à l'intérieur, afin de pouvoir mieux s'unir & s'incorporer
avec les fluides, se porter aux parties pour lesquelles on les destine, y —
produire les effets qu'on en attend: D'ailleurs l'estomach en supporte une
plus grande dose sans aucune disposition à se soulever.

Qui est ce qui n'a pas observé que les eaux minérales ne réussissent qu'à l'aide
du mouvement? On en tire de si grands secours dans cette rencontre,
qu'il y a souvent lieu de douter s'il n'est point la principale cause de
la guérison, qu'on attribue à ces eaux. Mais le mouvement est particulièrement
indiqué dans ce cas pour faciliter l'écoulement des eaux, empêcher qu'elles
ne séjournent dans les rides des intestins, & n'y acquièrent de mauvaises
qualités &c. Voilà pourquoi on ne permet pas aux malades d'avoir
des occupations, qui obligent de rester longtems assis, d'avoir le corps —
courbé comme font ceux qui jouent à des jeux qui méritent une attention
suivie; parceque cette situation favorise la stagnation des eaux.

On doit également avoir égard à la même indication pour l'usage
des douches & des bouës minérales. Soit qu'on y plonge les membres ou
le corps entier; il est utile d'exercer le corps ou la partie malade, —
quelques momens auparavant, pour dégourdir les organes, en favoriser
les sécrétions, & préparer par là, dans l'intérieur des substances animales
les effets salutaires que produisent immédiatement après l'application
extérieure des bouës qui déploient mieux toutes leurs vertus à l'extérieur
& à l'intérieur des corps & des membres en souffrance.

On connoit, avant que de sortir des écoles, l'indication de
l'exercice pendant l'usage des mercuriaux, afin de tenir les passages —
ouverts, de peur que les humeurs ne trouvant aucune issue, ne —
prennent une route contraire à celle qu'elles doivent suivre.

La pratique fait connoître que les malades qui sont obligés
d'user des bois médicinaux, pendant un certain tems, se plaignent
ordinairement de faiblesse d'estomach. Pour prévenir cet ~~incon-~~
inconvénient, lorsqu'on est obligé d'en continuer l'usage, l'exercice —
capable de fortifier les organes de la digestion est alors indiqué.

Examinons actuellement les indications des différens
exercices, suivant lesquelles on doit en prescrire l'usage dans
la cure des maladies chirurgicales.

Ces différens exercices du jeu de la paume, du volant, du balon de, aiant cet avantage. — qu'étant inséparables de la promenade, & contraignant de courir avec légèreté & la tête levée, ils ne sont pas seulement bons pour l'affermissement des bras, des jambes & des pieds, comme après la paralysie, &c; mais encore pour procurer à toute l'habitude du corps, une grande mobilité, à le rendre extrêmement souple & droit. La tête, & les yeux étant mis sans cesse en mouvement pendant l'usage de ces exercices; ils peuvent encore satisfaire aux différentes indications, de faire mouvoir en différens sens la tête sur le cou, afin d'étendre & relacher les muscles de cette partie, comme après la guérison des glandes en suppuration, après celles des brûlures du cou, ou enfin lorsqu'on a intention de fortifier les yeux, ou les muscles propres de cet organe.

Ces exercices faisant encore mouvoir le tronc avec vivacité, ils demandent qu'on se courbe d'autant plus souvent qu'on est mal-droit à ces sortes de jeux, & vu la grande agitation qu'ils donnent à tout le corps; ils peuvent être indiqués — utilement, lorsqu'il est question de dissiper le rhumatisme qui s'est jeté sur les articulations ou sur les lombes, et pour en prévenir le retour. Sans entrer dans de plus longs détails sur l'utilité de ces exercices, surtout celui de la paume, pour la guérison du rhumatisme & de la goutte, nous citerons, pour notre appui, la savante ^{+ thèse} de feu M. Bourdelin.*

Le jeu du Coryce des Grecs, qui ne différait de notre jeu du balon qu'en ce que les extrémités inférieures étaient en repos, tandis que les supérieures étaient exercées, pourrait être indiqué dans les cas, dont nous venons de parler; dans ceux surtout où l'on a à faire mouvoir que les bras & les mains, pour faire étendre & relacher les muscles & les ligamens trop roidis; comme cela arrive à la suite des plaies d'armes à feu, des fractures, &c: On pourroit augmenter les efforts & les mouvemens des bras, en proportionnant la grosseur du balon & la pesanteur de son contenu, en mettant au lieu d'air, de la sciure de bois ou du sable dans le balon.

Cet exercice étendant son action sur les viscères, il peut remplir — l'indication qu'on a de les secouer; & dans d'autres cas, pour faciliter l'expulsion des graviers des reins & de la vessie. C'est sans doute pour cela, dit Jerome Mercurial, „ qu'Auguste, qui étoit fort sujet à cette incommodité, avoit coutume, „ comme nous l'apprend Suétone, de s'exercer au jeu du follicule, (balle — „ pleine d'air), qui par la raison sans doute qu'il met en mouvement les parties „ supérieures, est recommandé, par Celse, à ceux qui ont un tremblement par tout le corps.

La Chasse considérée comme exercice est peut être le meilleur qu'on puisse imaginer pour fortifier toute l'habitude du corps, pour favoriser les mouvemens des articulations trop roides, pour provoquer la transpiration dans les différens cas où elle est indiquée, enfin pour procurer de la santé & de la vigueur.

La Chasse aiant encore cet avantage de récréer l'esprit en même tems qu'elle fatigue le corps, est particulièrement indiquée dans les cas d'atonie, d'engorgemens.

* An'è Rhumatismo recreatis pila, prophylacticum? M. L. C. Bourdelin
— auctore Anno 1733. Parisiis

lymphatiques dans les viscères, dans les glandes, &c. ou lorsqu'après une longue maladie, le malade est languissant, inquiet, qu'il a de la peine à recouvrer ses forces; parcequ'alors il a besoin de dissipation, de gaieté, il lui faut de l'action, du mouvement pour réveiller la chaleur naturelle, et pour rétablir les sécrétions. Mais avant que d'entreprendre un exercice aussi fatigant, & qui doit être continué longtemps pour en obtenir du succès, il faut s'y accoutumer par degrés en prenant d'autres exercices plus doux et plus modérés.

La Natation est indiquée, lorsqu'il reste de la rigidité dans les muscles & les ligamens des articulations; parcequ'étant relâchés par l'eau du bain, ils peuvent alors se prêter plus facilement aux mouvemens des membres; en observant toutes fois les précautions nécessaires, telles que les frictions sur la partie malade, & que l'eau ne soit pas trop froide, &c. Mais si c'est de la faiblesse qui reste dans les membres, comme après la paralysie, il convient que l'eau soit froide pour fortifier les parties en même tems qu'elles s'exerceront, en nageant.

Cet exercice est encore bien indiqué dans les cas où il est nécessaire de mettre vigoureusement en action les muscles de la cuisse & des bras; et pour diminuer ces vices de conformation que le rachitis laisse longtemps après la guérison de sa cause, sur les membres & sur l'épine. Les muscles du dos étant mis en action pendant cet exercice, tendroient à le rectifier un peu dans son état naturel; mais ce n'est qu'autant que cet exercice est répété plusieurs fois de suite & longtemps, qu'on peut en espérer du succès.

L'Escrime peut être regardée comme étant propre à satisfaire aux indications qu'on a de faciliter l'accroissement & l'aggrandissement de toutes les parties, surtout des bras & des jambes, & d'augmenter les forces d'un membre affaibli, tel que le bras droit, &c. Cet exercice étant bien dirigé & placé à propos, pourroit encore contribuer à la guérison des vices de la lymphe dont elle prévient les engorgemens & les dépôts chez ceux qui sont menacés de scrophul.

Lorsqu'il y a difficulté dans les mouvemens de pronation & de supination, à la suite des playes d'armes à feu, ou des fractures & luxations du poignet & de l'avant, l'exercice du fleuret est encore bien indiqué pour rétablir les mouvemens en question. Enfin l'exercice des armes peut donner lieu à des mouvemens propres à corriger les mauvaises attitudes & les difformités naissantes du tronc, des jambes & des bras, & à achever la cure commencée par l'application de certaines machines.

Il suffit de réfléchir un peu sur les effets, que nous avons attribués à l'exercice de la DANSE, pour appercevoir ses différentes indications. Aiant l'avantage de faire baisser les épaules & de les retirer en arrière; la Danse du menuet peut opérer un bon effet, lorsqu'après la fracture de la clavicule, le bras se rapproche trop de la poitrine. La position & le maintien forcent les extrémités supérieures à se retirer en arrière & à donner plus de jeu & d'étendue à la poitrine. Les muscles des jambes étant trop roides, se trouveront encor déliés par la danse. Enfin si l'on a l'indication d'exciter la transpiration, quoi de plus propre que les contredanses, qui sont plus animées, que le menuet ?



L'action de Sauter à raison des angles qu'elle fait faire aux corps, peut — satisfaire à l'indication qu'on a de faciliter la flexion des cuisses sur le bassin, & des jambes sur les cuisses, dont les articulations ont resté longtemps immobiles, pour la guérison des fractures des extrémités inférieures, &c; mais les forces de ces sortes de malades ne leur permettant pas de soulever le poids de leur corps pour sauter, afin de aider à ce mouvement, il faut se saisir, avec les mains, de quelque chose de solide, au moyen de quoi, l'on n'a que les — extrémités inférieures à soulever.

Il est assez ordinaire de voir après les maladies, qui ont exigé un long repos, & la nécessité d'être couché sur le dos, des personnes qui ne peuvent mouvoir leur corps sans les extrémités inférieures. Alors on a l'air si contraint, qu'il semble qu'on ait un pieu planté le long de l'épine; ce qui la rend rigide & la rend, pour ainsi dire toute d'une pièce. Il paraît que cette gêne, dans la flexion & dans les mouvements de l'épine, provient de ce que les cartilages intervertébraux sont trop serrés, & moins souples qu'il ne faut; & que les os, auxquels ils servent de lien, n'ont pas assez de jeu. Dans ce cas, la principale indication pour — corriger ce défaut accidentel, est de desserrer & d'assouplir les cartilages: c'est à quoi peut satisfaire l'action de Sauter qui oblige l'épine à se fléchir en devant &c.

Le Saut à cloche-pied étendant son action sur tout le côté du corps, qui porte sur le pied mis en action, peut remplir l'indication qu'on a de — déterminer sur un côté affaibli les forces nécessaires: On voit assez souvent des enfans plus faibles d'un côté que de l'autre; & si on les faisoit sauter à cloche-pied sur cette partie, on verroit bientôt l'inégalité des forces disparaître.

L'Exercice de la promenade modérée est très salutaire dans bien des cas. C'est principalement dans la cure des fractures simples ou compliquées, dans les plaies d'armes à feu, les ulcères, qui attaquent les extrémités supérieures, où la promenade est spécialement indiquée après que le temps des premiers accidens est passé.

Si au lieu de tenir ces blessés à une diète très sévère & ensevelis dans le lit, on leur permettoit de se promener ayant le bras en écharpe, qu'on leur — donnât à manger suivant leur état & à proportion de l'exercice de la promenade qu'on leur prescrivoit, & qu'on attendît dans cette position les événements, on verroit moins de ces malades languir des mois entiers dans le lit, tomber dans un état de maigreur & d'épuisement inexprimable, — causé par d'abondantes suppurations. Car il est trop ordinaire de voir dans les hôpitaux de ces sortes de malades chez lesquels il se développe, par l'inaction, un principe scorbutique, des cours de ventre, une fièvre qui les épuise quelquesfois si fort qu'ils deviennent alors sans ressource; au lieu — que si on leur prescrivoit l'exercice de la promenade l'espace de deux ou


Trois heures par jour, on leur procureroit, par là, l'occasion de respirer un air plus pur, dont l'influence seroit très avantageuse pour l'économie animale; cet exercice modéré donneroit du ressort aux solides, augmenteroit la circulation, — prévien droit les stases, les engorgemens, &c. &c. L'on doit plus craindre dans ces cas les mauvais effets du repos dans le lit, que le mouvement du corps; puisque les extrémités supérieures, étant mises en écharpe, ne reçoivent aucune action pendant cet exercice: Joignons à cela la dissipation, que prend un malade en se promenant; il y a plus encore, c'est qu'à supposer qu'il ait été blessé — dangereusement, il s'affecte moins de son état dès qu'on lui prescrit de marcher.

Nous ne prétendons^{pas} pour cela que la promenade soit dans ce cas un moyen de guérison; nous ne la conseillons que pour prévenir les suites fâcheuses d'un repos trop long dans le lit; & nous insistons de la recommander dans la cure des blessures les plus graves, après la cessation des premiers accidens; parcequ'à supposer que par leur nature, il fallût en venir à l'amputation, elle seroit plutôt praticable avec des espérances de succès. On nous objectera peut-être qu'un blessé n'a souvent pas assez de forces pour se soutenir? D'accord. Mais quoi de plus facile que de le faire marcher, en lui donnant des aides pour l'encourager & le soutenir? Il est vrai que le repos a ses avantages, & nous les déduirons en tems & lieu; mais vouloir que sous ce prétexte, la plupart des blessés (aux extrémités supérieures) s'abstiennent de la promenade, c'est une erreur préjudiciable.

Pour mieux démontrer encore que l'abus du trop long séjour dans le lit est beaucoup plus dangereux que celui de l'exercice, faisons une réflexion, qui — s'étendra généralement sur le reste de ce mémoire.

Il en est de nos corps comme du fer, qui s'use étant employé; mais que la rouille use bien davantage quand nous l'oublions. Jamais l'exercice n'a rendu les membres perclus, & le repos produit tous les jours cet effet, en une infinité d'occasions. Si l'on réfléchit qu'il y a dans l'espace, où s'articulent les extrémités des os, une liqueur sinoviale propre aux mouvemens des articulations, & que lorsque cette humeur vient à être, ou trop abondante, ou trop visqueuse, — elle est plutôt un obstacle qu'un aide au mouvement dont il s'agit; que la partie alors devient lourde, pesante, & sans action, que les muscles & les ligamens se roidissent, & que cette viscosité est telle quelques fois, qu'elle va jusques à la concrétion, accident qui arrive presque toujours & très promptement dans un gouteux, s'il ne marche pas; dans un blessé, si on ne remue pas son membre fracturé, car l'anchilose survient alors. &c. &c.

Si l'on réfléchit à tout cela, dis je, on conviendra sans peine que ces accidens sont les effets nécessaires du trop long repos; & que l'indication de faire promener les blessés aux parties supérieures, surtout quand leur guérison est lente; doit être réputée en chirurgie d'une nécessité, que — nous osons dire absolue.



La Promenade forcée peut encore satisfaire à l'indication qu'on a d'exciter une abondante transpiration, ou lorsqu'on a en vue de faire dissiper par cette évacuation le virus vénérien, tel que celui qui s'est manifesté par des exostoses, &c. &c. Mais le succès de cet exercice ne serait favorable dans ce cas, qu'autant que l'humeur morbifique serait disposée à circuler, & pendant l'usage d'une décoction sudorifique, telle que celle de gayac, dont la boisson abondante, mais prise à une certaine mesure, serait suivie de la promenade continuée jusqu'à l'apparence d'une sueur considérable.

Il est aisé de se rendre raison de cet effet, par ce que nous avons dit du mouvement en général. Le corps étant rempli par une telle décoction, il survient un plus grand mouvement dans les fluides; ceux-ci parcoureront d'autant plus facilement les vaisseaux que l'action musculaire sera mise en jeu par l'exercice violent; d'où doit s'ensuivre une fonte d'humeurs, qui se portera ensuite à la surface de la peau. En effet l'exercice violent d'un membre, attaqué d'exostose, détermine & attire, pour ainsi dire, la vertu de cette liqueur aromatique vers la partie affectée; il agit dans ce cas, comme les frictions légères, dont l'effet est d'attirer les liqueurs à la partie frottée.

Mais sans entrer dans de plus grands raisonnemens, la pratique nous fournit la preuve de ce que nous avançons. Un Professeur des écoles de Chirurgie de Paris, dont nous avons eu l'avantage d'entendre les leçons, a dit plusieurs fois, que l'exercice d'une promenade fatigante pendant l'espace de 2 ou 3 heures, répétée deux fois par jour pendant six semaines, avait dissipé des exostoses & guéri radicalement des maladies vénériennes très compliquées, les malades faisant en même tems usage de la décoction de gayac, à dose convenable.

Nous pourrions rapporter la guérison d'un jeune homme attaqué d'exostose vénérienne à la partie interne et supérieure de la jambe, qui, rebuté des frictions mercurielles, par la gêne de ses parens, fit usage d'une tisane sudorifique, et qui, sans qu'on lui en eût donné le conseil, se livrait par goût à toutes sortes d'exercices fatigans, comme de patiner sur la glace, de faire des armes, & de danser tous les jours; l'exostose du jeune homme disparut au bout de quelque tems, & sa guérison due en partie au hasard, confirme l'opinion que nous avons avancée d'après le Maître célèbre que nous avons cité. D'où il résulte que l'exercice forcé de la promenade, seconde parfaitement l'action du médicament indiqué, en augmentant le ressort des vaisseaux, en accélérant le mouvement du sang, en atténuant la lymphé & la mettant en état de pénétrer plus promptement jusqu'aux tuyaux excrétoires de la peau; enfin en chassant ~~continuellement~~ continuellement et conjointement avec l'action vitale, les humeurs par cet émunctoire.

L'action de marcher par des chemins raboteux est indiquée, lorsqu'il est question de donner du ressort & de l'action aux membres affaiblis & dans l'atonie, comme à la suite des douleurs cruelles de la goutte & de la paralysie; mais ce n'est qu'après qu'elles sont cessées, & qu'on s'est promené d'abord lentement pour délier les jambes, qu'on peut espérer d'en recouvrer l'usage en marchant souvent par des chemins raboteux.

Enfin les exercices, qui mettent en action les extrémités inférieures, comme de marcher, courir, frotter, &c. sont indiqués dans les cas, où il faut fortifier ces parties & faciliter l'allongement des muscles, donner de la mobilité aux articulations, & lorsqu'il y a indication d'une pléthore locale, comme aux parties naturelles de la femme.

Qu'on ne soit pas étonné, si nous indiquons ces exercices aux jeunes filles dont

Les règles sont supprimées !

Il est encore des gens qui n'hésitent pas de prescrire les saignées du pied, pour, disent ils, attirer le sang en bas; mais qu'il nous soit permis de rejeter leur avis. On sent après les dangers des saignées du pied, & des éménagogues; ce n'est pas ici le lieu de dissertar sur cet objet. Il suffit que nous fassions remarquer que les exercices qui mettent en action les extrémités inférieures, étendent leur mouvement sur les viscères du bas ventre, - auxquels ils impriment des secousses; en ranimant la circulation dans le système mésentérique, ils détruisent les principes d'obstruction, d'où s'ensuit bientôt le retour de l'écoulement périodique. N'est ce pas à la fatigue & à l'exercice que les femmes de la campagne doivent la régularité de cet écoulement ?

Ambroise Paré en parlant des maladies des vierges, causées par la suppression des règles, dit, " qu'il faut que la malade chemine, saute, travaille, danse, monte, descende souvent, qu'elle tire de l'eau d'un puits, & autres exercices, si elle les peut supporter, &c. &c.

Nous avons eu la satisfaction de voir de jeunes filles qu'on avait saignées plusieurs fois du pied, menacées d'un état cachectique, acquérir une meilleure santé & devenir réglées, par les seuls exercices de la danse, des voyages à pied, & par les travaux du jardinage, que nous avons conseillés.

L'action de monter & de descendre a ses avantages; et nous pensons qu'elle est indiquée pour prévenir la noueure des enfans, Mais l'action de monter dans des chemins un peu vides, peut satisfaire à des indications particulières; c'est principalement dans le cas où l'on boîte du pied, & que le talon ne touche pas aisément à terre: accident qui provient de ce que le tendon d'achille est quelques fois si court, qu'on est obligé de marcher sur la pointe du pied sans pouvoir appuyer le talon à terre; ce qui fait une difformité pour le marcher; outre qu'en même tems, elle cause beaucoup de fatigue. Cet accident est assez ordinaire à la suite des brûlures, des plaies d'armes à feu, &c, qui arrivent à la partie postérieure et inférieure de la jambe. Ainsi lorsque le raccourcissement du tendon d'Achille n'est pas la suite de la rupture complète; c'est alors qu'on peut espérer après l'usage des topiques, de rendre ces secours efficaces, en s'exerçant souvent à monter des plans inclinés, comme il y en a dans quelques jardins, à la campagne &c, parceque le bout du pied, quand on monte est obligé de lever; Or il ne peut lever que le tendon de la jambe ne descende, & en même tems le talon.

Parmi les exercices des extrémités Supérieures, il y en a qui sont propres à rétablir les mouvemens de l'articulation du bras avec l'omoplate, ceux de flexion & d'extension, de redonner de la force aux bras qui ont été affectés de paralysie, &c; c'est dans ces differens cas & autres de ce genre que le jeu de la fronde, l'action de limer, de tourner, de scier, &c, et l'exercice qu'on prend en tournant une manivelle, peuvent satisfaire aux indications curatives. On a vu plus d'une fois les ouvriers qui se servent de la lime, de la scie & du tour, recouvrer les mouvemens de leurs bras engourdis ou paralysés, dès qu'ils ont eu assez de forces pour retourner à leurs ateliers.

Lorsqu'après les fractures du bras près l'articulation du coude, les plaies, ou autres maladies, qui ont exigé un long repos du bras, les muscles & les ligamens sont

roidis, —



roidis, ou raccourcis au point qu'on ne peut étendre le bras, ou enfin lorsqu'il y a disposition à l'anchilose, &c. Quoi de plus propre à satisfaire aux indications que l'action de sonner les cloches, de tirer de l'eau d'un puits, de grimper à un arbre, de monter après une corde garnie de noeuds? C'est alors que les muscles sont forcés de s'allonger, que les articulations se meuvent en différens sens, que la synovie se broyant, humecte & lubrifie les parties disposées à se souder, & que les ligamens se relâchent.

Nous observerons qu'on ne doit mettre en usage ces exercices qu'après avoir employé les relâchans, les dissolvans en topique; & que si l'on est obligé d'en venir aux douches, elles deviennent plus efficaces, lorsqu'en même tems on se livre à ces exercices les plus modérés pour en venir après aux plus violens.

Les plus célèbres anatomistes, & surtout Winslow, ont fait connoître tous les accidens funestes qui dérivent de l'abus des corps à baigne, en ce qu'ils rendent la poitrine étroite, serrée, applatie. De ces vices de conformation naissent des dérangemens dans l'économie animale, que l'on prévoit assés, sans qu'il soit nécessaire de nous y arrêter. On est souvent consulté pour remédier à la pluspart de ces maux: on ne peut qu'à regret se flatter de les guerir radicalement, tant que l'on ne remédie pas à la difformité de la poitrine qui est la principale cause de ces accidens. Or pour remplir cette indication, il faut chercher les moyens d'augmenter la capacité de la poitrine: ainsi les différens exercices des bras, en réagissant sur le thorax peuvent contribuer à sa dilatation. Par exemple, l'action de scier, de frapper du marteau, de piler, de sonner, de ramer, de battre à la grange, de mouvoir une manivelle, de remuer le râteau & les outils du jardinage, de se servir de la hâche, en agitant les bras avec violence, étendent leur action sur les cartilages des côtes, & développent ainsi la poitrine, font de la place aux poumons, aux viscères de l'abdomen, qui ne sont plus alors aussi comprimés par le rapprochement des fausses côtes.

Ces exercices peuvent donc corriger, par la gymnastique brachiale, les difformités venues de naissance ou par l'abus des corps baignés, ou par quelque autre cause. Nous observerons encore que ces exercices doivent être égaux & soutenus, afin de dilater également & d'une manière uniforme la charpente osseuse de la poitrine; parceque si on ne s'exerceoit que d'un seul bras, les cartilages des côtes étant tirés inégalement & par saccades, il arriveroit saillie d'un côté plus qu'à l'autre, ce qui, sans remédier totalement à la difformité, en donneroit par là une nouvelle. Dès lors on sent la nécessité d'employer dans ces exercices, autant que faire se peut, les deux bras indistinctement ou ensemble ou séparément.

Les exercices du bras sont indiqués par Fabrice d'Hilden * pour atténuer & faire dissiper certaines humeurs de nature rhumatisante, qui se nichent quelquesfois dans l'aponeurose brachiale. Il dit en avoir fait l'essai sur lui même, & n'avoir pu guerir, quelques bons topiques qu'il eût employé, qu'en s'exerçant violemment des bras, & en les étendant avec force.

* Obs. 79. Cent. I. Fabr. hild.

Fabrice d'hilden regarde encor les exercices, qui font étendre les bras & qui tiennent le corps suspendu par les mains, comme capables de favoriser la sortie des urines retenues dans la vessie par la présence d'un abcès situé dans le canal de l'urèthre, il rapporte à ce sujet l'observation suivante. (Cent. I. p. 58).

..... Octogenarium cum doloribus ex retentione urinae, propter abscessum in ductu urinario, afflictatum, curandum habui; qui spatio quatuor aut quinque dierum urinam reddere non potuit, nisi porrectis in altum brachiis, & projectis in funem ad id aptatum manibus, atque ita reliqua corporis mole extensa, non secus ac si tortura afficeretur. Tandem rupto abscessu, pus foetidissimum emanavit, dolores ac reliqua symptomata remissa sunt atque sic pristinam sanitatem, qua adhuc dei beneficio fruitur, recuperavit.

Cette observation donne de nouvelles vues pour prescrire les exercices des bras, dans l'intention d'exciter l'ouverture des kistes, ou des abcès situés vers les parties inférieures dont l'opération pourroit être dangereuse. D'après ce que nous avons dit des effets de ces exercices, on peut croire que l'action musculaire étendant ses effets sur une partie affectée par un amas de pus en maturation, feroit crever le kiste ou l'abcès. Il est assez ordinaire de voir des clous situés dans des parties soumises à certains mouvements du corps, s'ouvrir par les moindres efforts que des ouvriers font en travaillant. Ainsi dans ces cas là, avant que d'en venir à l'incision, on pourroit prescrire l'espèce d'exercice convenable à cette indication; & l'on prévienendroit peut être une incision qui répugne aux hommes les plus courageux.

On sait de quelle utilité peut être le bon lait d'une nourrice qui allaite un rachitique, ou d'autres enfans malades. Dans ces différens cas, l'indication de l'exercice modéré, particulièrement celui des bras est indiqué à ces dames qui nourrissent, & aux nourrices gagées, qui dans ces grandes maisons, mènent ordinairement une vie sédentaire, capable de faire dégénérer le lait & de lui faire perdre l'activité qu'il doit avoir. Ainsi les exercices que nous indiquons doivent consister dans quelque travail qui obligeroit les bras à se mouvoir, comme de coudre, de tricoter, de faire des nœuds, de frotter les meubles, de balayer, &c. Il en résulteroit que le sang marcheroit avec plus d'activité aux mamelles, & que le lait qu'il y déposeroit, se prépareroit mieux. C'est le sentiment du docte Varanda*. En effet il est certain que les nourrices qui font de l'exercice, & qui travaillent, ont un lait beaucoup plus sain, que celles qui sont continuellement clouées à leur chaise, & au berceau de leur nourrisson.

* Ne sit deses et otiosa nutrix, sed alacris, & ad suscipiendos labores comparata, potissimum in quibus brachiorum motus requiritur, ut sanguis ad mammas copiosior attrahatur, & lac melius concoquatur.

== Joan. Varanda de morbis mulier. Cap. I. De Regimine infantis nuper nati & nutricis.



Les exercices, qui mettent en action les doigts & la main, comme de jouer du violon ou des autres instrumens à corde, de coudre, de tricoter, &c, sont propres à satisfaire aux indications que l'on a de rétablir l'agilité de ces membres, de dissiper l'engourdissement des muscles extenseurs & — fléchisseurs qui peut s'y trouver & qui y survient ordinairement par le repos qu'on est obligé de garder pendant la cure du panaris, des — brûlures, des plaies, des fractures, ou luxations qui affectent ou la main entière ou quelques doigts seulement.

À l'ignorance dans ces sortes d'exercices, on en peut opposer d'autres, tels que de prendre du sable à la poignée, de rouler un étui dans la main, de pétrir & de manier de la cire, de plier & d'étendre des — lames de plomb. On a souvent employé avec succès ces sortes — d'exercices pour broyer & diviser l'humeur tophacée qui s'était jetée dans les articulations des doigts de la main, à la suite des accès violens de goutte, & qui avait produit une espèce d'anchilose.

Enfin il est une infinité d'autres cas chirurgicaux où ces — différentes indications peuvent s'appliquer. Nous serions infinis si nous les parcourions tous. Passons aux exercices de la voix.

Nous avons dit plus haut que, lorsqu'on avait l'indication d'attirer des sucs nourriciers dans une partie, ou un fluide nuisible à faire sortir, l'exercice — pouvait accomplir ces effets. Ainsi lorsque le p^{ou}mon est faible, que la circulation y est lente, ou quand les bronches sont embarrassées par la mucosité, l'action de parler & de lire à haute voix sont propres à satisfaire aux indications que l'on a de fortifier les p^{ou}mons, d'en faciliter l'expectoration, & de favoriser la — circulation dans cet organe.

C'est principalement dans l'asthme humide, qui est toujours accompagné de la faiblesse du p^{ou}mon, ou l'action de lire & de parler haut est indiquée, sans cependant crier. Dans les commencemens de cet exercice, il faudra s'arrêter de tems en tems lorsqu'on se sentira fatigué, reprendre lorsqu'on aura acquis de nouvelles forces, en continuant ainsi tous les jours & en augmentant peu à peu l'exercice en question, & toujours dans un tems convenable; insensiblement les asthmatiques rendront le jeu de leur poitrine plus libre & dilateront leurs p^{ou}mons, &c. On sent aisément que cet exercice ne doit être employé que sur la fin & hors le tems des accès.

Ces sortes d'exercices pourroient encore être bien indiqués dans le mutisme qui procède d'une paralysie de la langue, pourvu qu'elle ne soit pas au dernier degré. Mais, pour en assurer le succès, il faudroit d'extrêmes efforts pour déterminer la langue à se délier; ces efforts pourroient être excités par une cause extérieure, telle que seroit une émotion qu'on donneroit au malade pour le forcer à articuler quelques paroles. Alors dès qu'il aurait pu prononcer quelques mots, — les muscles de la langue reprendroient bientôt leur mouvement.

Zuinger * rapporte, qu'un paysan aiant extrêmement soif, après avoir soutenu un travail, dans un violent jour d'été, alla boire de l'eau très froide, & devint muet sur le champ; le froid de cette eau lui aiant causé une paralysie à la langue. Il passa une année dans ce déplorable état, n'espérant plus de guérison. Mais un jour comme il portait sur ses épaules un pesant fardeau, composé de plusieurs pièces détachées, l'une de ces pièces lui tomba sur une jambe, & la lui cassa. La douleur que sentit le blessé, lui fit faire à l'instant un effort extraordinaire pour appeler du secours, & cet effort violent excita une si grande secousse dans les muscles de la langue qu'ils reprirent leur action, & que le muet recouvrit sur le champ la parole. **.

L'action de parler & de lire à haute voix, & la déclamation, peuvent encore satisfaire à l'indication de la rupture d'une vomique. Il y a des exemples d'acteurs sur le théâtre, qui aiant voulu jouer trop tôt la comédie, peu de tems après une maladie de poitrine, ont rendu sur la scène du pus par la bouche, que les efforts de la déclamation avaient sollicité, par la rupture d'un abcès existé dans le poulmon.

Les Anciens recommandaient beaucoup l'action de parler à voix fort haute, à ceux que la faiblesse, surtout aux jambes, empêchoit de travailler, ou de se donner d'autres mouvements. Le judicieux Plutarque dit, qu'il est étonnant combien l'exercice journalier de la voix, est avantageux, non seulement à la santé, mais même à l'entretien des forces, non pas de celles qui font les athlètes, ou rendent les hommes nerveux, — mais de la force & de la véritable vigueur des principales viscères du corps, d'où — dépend principalement le rétablissement de la santé. ***.

L'action de crier peut être bien indiquée encore dans l'espèce d'enrouement causé par une humidité superflue dans le larynx, & dans le relachement des organes de la voix, parceque la sortie de l'air, ébranlant avec force les différentes parties qu'il rencontre, les poulmons étant extraordinairement dilatés, toutes ces parties recevant plus d'action, se **déchargent** des humeurs superflues, les fibres musculaires acquièrent plus de forces, & la voix de faible qu'elle étoit, devient plus forte.

Cet exercice pourrait favoriser de plus la sortie de ces petites pierres, blanches et friables qui se forment dans les poulmons; il ne manquerait à cette indication que la certitude des symptômes de la formation de ces pierres.

Ajoutons que les cris aident aux blessés, à supporter les douleurs qu'ils éprouvent pendant les opérations chirurgicales. Mais cet exercice serait nuisible pendant les opérations que l'on pratique au bas ventre, à la poitrine, comme dans le bubonocèle, dans l'empyème &c. Les efforts que l'on ferait alors en criant, tendraient à pousser au dehors les viscères.

* Theophrastus Zuinger, Theatr. Prax. Med.

** C'est par un effort plus violent, & dans une occasion qui en étoit, sans doute, bien plus digne que le jeune Atys si célèbre dans l'histoire, lequel étoit aussi muet, commença de parler. Il crût voir le moment que le Roi CROESUS son pere, allait recevoir sur la tête un coup de cimeterre; l'émotion que lui causa ce terrible spectacle, lui rétablit tout d'un coup la langue, & le fit s'écrier sur le champ, par un effort aussi extrême que naturel: Arrête, Soldat, ne porte pas la main sur mon pere. Depuis ce moment il continua toujours de parler.

¶ Nous n'avons rapporté ces observations qu'afin de donner une idée des grands efforts de la voix, — comme étant propres à guérir la paralysie de la langue; c'est aux gens de l'art à tirer de ces moyens pour les appliquer à d'autres cas semblables.

*** Usus sermonis voce pronuntiati quotidianus mirum dictu quam utile sit genus exercitationis, non ad sanitatem duntaxat, sed et ad vires, non quidem athleticas eas, aut quæ carnes augeant, sed quæ principibus corporis membris, penes quæ vitæ potissimum facultas est, naturalis robur, verumque vigorem ingenerant. Plutarch. Opera. T. II. p. 130.



La rétention, la suppression d'urine, qui n'ont d'autres causes que l'inertie — ou la paralysie du col ou du corps de la vessie, pourrait encore trouver, dans — l'action de crier, un moyen accessoire propre à mettre ce viscère en contraction, par les efforts que l'on pourrait faire en criant.

L'exercice du Chant peut fournir à la Chirurgie des secours propres à — Satisfaire aux indications de remédier aux vices de la voix, & à la faiblesse de la poitrine. Nous dirons à cette occasion qu'il existe encore un préjugé de défendre la musique aux jeunes personnes qui ont la poitrine délicate; mais ce que nous avons dit des effets du chant, & l'expérience journalière prouvent le contraire. Car le vrai moyen de donner de la force aux poumons, c'est d'exercer la voix. Les inspirations fréquentes que l'on fait en chantant sont autant de moyens efficaces pour broyer & diviser le sang, et en favoriser la circulation.

On a vu des enfans très délicats menacés de pulmonie, dont la vie paraissait prête à s'échapper au moindre souffle, dont la mauvaise constitution a changé en se donnant à la musique vocale; on les instruisoit sans les contraindre, on paraissait les amuser; & par ce moyen on réussissait à les former pour la force et pour le talent.

Comme la voix se ressent du trop ou trop peu d'usage qu'on en fait, & qu'on peut la corrompre en parlant trop haut, ou en gardant trop longtems le silence; dans ce dernier cas les organes de la voix oublient, pour ainsi dire, leurs fonctions par le peu d'usage. Il semble que l'action de Chanter serait bien indiquée dans ces deux cas, puisque l'on peut corriger par son moyen le défaut qu'elle a contracté, et modérer son ton glapissant par un mélange de tons plus graves. Il y a des femmes qui ont une parole d'homme, & des hommes qui ont une parole de femmes. On sait que l'organe de la voix dans les femmes, est d'un diamètre beaucoup moindre que dans les hommes, ce qui fait qu'elles l'ont plus claire & plus déliée. On sait aussi que la grosse voix vient de l'ampleur du larynx, & la petite, du peu de capacité de cet organe.

Il résulte de là, que pour corriger la voix d'une femme qui l'a trop grosse, & celle d'un homme qui l'a trop grêle, l'indication est de tâcher de — diminuer ou augmenter le calibre de cet organe. C'est à quoi peut satisfaire l'exercice de la parole & surtout celui du chant, après avoir employé les remèdes locaux propres à resserer ou à relâcher les parties.

Ainsi l'action de parler aux oiseaux, comme aux perruches, aux serins, & auxquels on apprend à prononcer certaines paroles, exigent dans la prononciation un resserrement de l'ouverture du larynx, afin de valentir la sortie de l'air, & pour imiter le son de voix de ces petits animaux.

L'action de chanter en produisant des sons aigus & perçans, contribuerait encore à diminuer l'ampleur du larynx. Si l'on répétait de tems en tems ces exercices, il serait possible qu'ils pussent satisfaire aux indications de — corriger le vice de la voix d'une femme. Nous observerons que ce serait perdre le fruit de ces exercices, si l'on écoutait chanter des personnes qui ont la voix extrêmement grosse; parceque la force de l'habitude l'emporterait.

Quant aux hommes qui ont une voix de femme, L'exercice du chant Satisferait à la même indication, mais en raison inverse. Il faudrait à cet effet, S'exercer Souvent à chanter la basse; parcequ'il faut un grand coeur de voix pour la basse; & à force de S'accoutumer à cet exercice, on réussiroit peut-être à grossir sa voix pour toujours.

Mais avant que d'en venir au chant des paroles, on pourrait S'exercer à prononcer en chantant, le matin. Dès qu'on est levé, ces voyelles gutturales A et O, dont la prononciation exige un relâchement du fond de la gorge.

Enfin le jeu de ces ^{enfants} qui s'amuse à crier & à chanter dans un tonneau, nous fournit encor un moyen de remplir l'indication. Car en mettant sa bouche à l'entrée d'un tonneau ouvert par en haut, & le faisant réentir de sa voix, & la grossissant le plus qu'il serait possible, les sons de voix rétentissans dans ce tonneau, semblable à un écho, feraient perdre alors l'habitude de la voix grêle, & les muscles de cet organe se relâcheroient insensiblement par cet exercice continué & répété souvent dans le jour.

Les Juges éclairés, qui nous lisent, Sentent mieux que nous sans doute qu'on ne pourrait espérer du Succès de ce dernier moyen que dans la jeunesse seulement.

L'action de jouer des instrumens à vent, dilatant extraordinairement les jouës, la poitrine, excitant une tension dans les muscles de l'abdomen, & les viscères étant, par ce mécanisme, foulés et comprimés par intervalles, peuvent remplir l'indication de donner du ressort à ces parties lorsqu'elles sont dans l'atonie, ou qu'il est nécessaire de déterminer une pléthore dans le bas ventre.

Cet exercice peut être de quelque utilité aux personnes qui ont les jouës rétrécies à cause des cicatrices difformes dans cette partie; parcequ'alors le gonflement des jouës causé par la présence de l'air qu'on souffle dans l'instrument à vent, peut étendre et allonger les muscles des jouës, au point de leur rendre une partie de leur expansion naturelle, & même au delà. Si on continue journellement et longtems cet exercice, *; Mais il faut pour cela, choisir les instrumens à vocal, tels que le Cor de chasse, la trompette, le Serpent, &c. Il n'est même pas nécessaire de savoir jouer de ces instrumens pour satisfaire à cette indication: il suffit d'essayer d'en tirer des sons quelconques, parcequ'ils produiront le même effet sur les jouës, que si on rendait des sons agréables.

* Je me rappelle d'avoir vu à la verrerie de Sèvres un homme dont les jouës étaient pendantes & plissées, à force d'avoir soufflé dans le tube qui sert à porter l'air dans le verre fondu, pour en former ensuite des bouteilles. Cet effet est à peu près le même que celui qui résulte de l'action des instrumens à vent sur la bouche.

Indications des Exercices du Second genre.

Il est indubitable que les mouvemens des muscles fortifient le corps; mais ils l'épuisent & occasionnent une dissipation d'esprits animaux égale à l'augmentation de cette sécrétion qu'ils procurent. Par cette raison les exercices du premier genre ne peuvent contribuer au rétablissement des malades affaiblis; Mais ceux du Second, savoir la gestation que l'on prend dans la litière, dans les différentes voitures, ou sur l'eau, &c., sont particulièrement indiqués aux personnes faibles, qui ne peuvent soutenir que des mouvemens modérés & sans faire dépense de forces.

L'utilité de ce genre d'exercice est démontrée à l'égard des enfans qui, pendant le tems de la faiblesse de l'âge, ne peuvent se passer d'être continuellement agités, secoués, & qui lorsqu'on les prive du mouvement pendant trop longtems, témoignent par leurs cris le besoin qu'ils en ont; cris qu'ils cessent en s'endormant; aussitôt qu'on leur a suffisamment procuré les avantages attachés aux différens exercices qui leur conviennent. Ces exercices, comme tout le monde sait, sont l'agitation accompagnée de douces secousses, & du branle dans le berceau par l'effet duquel le corps de l'enfant qui y est contenu, étant porté contre ses parois alternativement d'un côté à l'autre, en éprouve des compressions répétées sur la surface, qui tiennent lieu du mouvemens des muscles.

Ceux qui ont été affaiblis par de longues maladies, sont, pour ainsi dire, redevenus enfans, ils doivent donc être traités de même. Cela posé, tâchons d'indiquer dans quelle sorte de maladies, les exercices du Second genre peuvent être favorables.

On sait par l'Anatomie que les viscères de la poitrine & de l'abdomen sont adhérens à des moyens d'union qui les tiennent, pour ainsi dire, suspendus, tels que le foye, &c. La Sagesse que le Créateur a fait briller dans tous ses ouvrages, ne nous permet pas de douter que ce mécanisme n'ait quelque but important: Car c'est afin que ce viscère soit agité et mis en mouvement par le diaphragme qui s'abaisse & s'élève continuellement par la respiration, d'où il arrive que la circulation du Sang, qui sans cela serait languissante dans le foye, &c., est accélérée.

Cette marche indiquée par la nature nous fait appercevoir celle que nous devons suivre dans les maladies, qui attaquent ce viscère; comme dans la cure des obstructions, des coliques calculieuses de la vésicule du fiel, &c. Les principales indications, dans ces cas là, sont de rétablir les sécrétions, de résoudre & dissiper les engorgemens trop ordinaires dans les rameaux de la veine porte, & de faire expulser les calculs biliaires.

Quoi de plus propre, à ces indications, que le mouvement de la chaise à porteur, de la litière, ou celui du bateau, lorsqu'il y a faiblesse; ou celui de la voiture, qu'on prolongerait & qu'on rendrait plus rude à mesure que les forces augmentent & qu'on ferait un plus grand usage des remèdes intérieurs.

Cette Gestation modérée, est encor bien indiquée dans la cure de l'ulcère au poulmon, dans les différentes espèces d'hydopisie, &c., pour donner du ressort aux parties solides, ainsi qu'aux viscères qui ont perdu leur action par l'abondante sérosité qui les baignoit.

auparavant, à ceux qui sont dans le marasme à la suite de la fièvre lente, des ulcères, des hémorragies, des épanchemens dans le bas ventre, de la paralysie; à ceux qui sont amaigris par d'abondantes suppurations; à ceux qui sont si faibles & si débiles au sortir d'une longue maladie, qu'ils ne peuvent ni se soutenir, ni supporter la moindre fatigue, pour réveiller, sans effort, l'action des viscères & leur rendre par degré leur ancienne vigueur. Celse, en parlant de ces malades très affaiblis, conseille la gestation. Longis & jam inclinatis morbis aptissima est gestatio. Mais parvenus à un certain degré de vigueur, par l'usage de la gestation modérée; c'est alors que ces malades doivent monter dans une voiture roulante, & n'aller d'abord que lentement en vase campagne & sur la pelouse, jusqu'à ce que les forces leur permettent de supporter sur un terrain inégal & pierreux, les violentes secousses d'un char moins bien suspendu. Ces indications sont les mêmes dans la cure de l'asthme, mais surtout dans les intervalles des accès, pour entretenir l'expectoration.

Sydenham & le Commentateur de Boerrave s'accordent à dire que ce mouvement passif est très avantageux dans ces différens cas. En effet la douce agitation qu'il procure à tout le corps, ne lui coûte ni peine ni fatigue: Il ajoutent que ce serait inutilement que l'on chercherait à détruire d'une autre manière les racines anciennes & profondes de différentes maladies chroniques.

Mais ne se contenter qu'à satisfaire aux indications, par les exercices du second genre, cela ne suffirait pas: Il faut, par la suite, avoir recours à ceux du premier genre, dont nous ne faisons mention ici, que parceque cela nous a échappé; ainsi c'est l'âge, le sexe, les penchans du malade, la condition, ses habitudes, l'état de ses forces qui doivent alors déterminer le choix de la fatigue, des jeux, de l'exercice des armes, de l'action de la danse, des travaux du corps, des courses de la chasse, de la promenade, &c, pour achever ce que les mouvemens de la gestation & de l'équitation ont commencé.

Le mouvement d'une voiture roulante, et surtout d'une charrette sur le pavé, lorsque les forces le permettent, est bien indiqué dans la cure du rachitis, pour exciter des violentes ^{secousses} dans les viscères, y ranimer la circulation, réveiller la chaleur naturelle, & mettre en jeu l'action musculaire.

Mais lorsqu'on a l'indication de faire exercer les extrémités inférieures des enfans rachitiques; les petits traîneaux à roulettes nous paraissent suffisans, pour les enhardir à faire quelques pas, & à se soutenir sur leurs jambes; par ce moyen leur vie n'est point en danger, les mains appuyées sur les bords de ce traîneau sont suffisantes pour soutenir le corps; et pour peu qu'on pousse le traîneau d'un côté ou de l'autre, ils sont obligés de le suivre, ce qui ne peut se faire sans que les jambes agissent.

On ne peut guères prescrire la Navigation à toutes sortes de malades; le plus grand nombre n'étant pas à portée de se procurer cet exercice. Ce moyen est bien indiqué lorsqu'on a en vue de solliciter par le vomissement naturel, l'évacuation d'un amas de bile qui fait engorgement dans le foye, et surtout la sortie de ces concrétions bilieuses qui se sont faites dans le canal colédoque.



La Navigation pourrait encore être bien indiquée dans la cure de la phtisie. Si l'on en veut croire les deux Plin, les Médecins Romains envoyaient les pulmoniques à Alexandrie en Egypte, non seulement pour leur faire changer d'air; mais principalement encore pour les exposer à un plus long exercice, & à une plus grande agitation, pendant une navigation aussi longue que l'exigeait un pareil événement. C'est ce qui a fait dire à Celse: Si vera phtisis est, opus est longâ navigatione.

Indications des exercices du troisième genre.

Ces exercices, savoir le jeu de la branloire, celui de l'Escarpolette, & l'équitation, conviennent à ces malades encore languissans qui, sans avoir beaucoup de forces, peuvent cependant mettre un peu d'action dans l'exercice & l'augmenter par degrés, à proportion qu'ils reprennent de la vigueur; à ces malades qui ont besoin d'être exposés à l'air renouvelé & d'éprouver des secousses, pour mettre plus en jeu le système des solides & la masse des humeurs: ce qui doit être continué jusqu'à ce qu'on puisse soutenir de plus grands efforts, et passer aux exercices, dans lesquels on produit soi-même tout le mouvement qu'ils exigent.

Le jeu de la Branloire & de l'Escarpolette est propre à satisfaire à quelques unes des indications, de la gestation en voiture, &c; mais l'escarpolette nous offre un grand secours dans la cure du rachitis, soit pour en arrêter les progrès, soit pour prévenir ce mal.

En effet la pesanteur du corps de l'enfant rachitique, jointe aux mouvemens qu'il fait de lui-même, étant balancé dans une escarpolette, oblige les ligamens à se relâcher & à s'allonger. Mais ce qui contribue le plus à cet allongement des membres, c'est la peur qu'a l'enfant de tomber; parceque cette crainte lui fait faire des mouvemens extraordinaires, tous les muscles, dans ce tems là, étant en action. La joye que ressentent au contraire quelques autres enfans de se voir ainsi bercés, leur fait faire des tréssailemens & des mouvemens extraordinaires, qui sont d'un grand secours pour leur dégager l'épine.

L'Equitation est propre à satisfaire à un grand nombre d'indications; mais ce serait trop nous écarter de nôtre plan, si nous entrions dans tous les détails à cet égard; nous en parcourerons quelques uns.

Tous les auteurs qui ont traité des maladies chroniques, regardent l'exercice à cheval comme devant mériter la préférence sur tous les remèdes qu'on estime les plus efficaces dans les dispositions phtisiques, hectiques, scorbutiques & cachectiques.

En effet cet exercice paraît bien indiqué dans les maladies des viscères du bas ventre qui sont la suite d'un sang épais & glutineux, qui produit des stases, des obstructions dans le foye & les autres viscères; dans les jaunisses les plus opiniâtres, produites par les engorgemens de la bile tant dans les pores biliaires, que dans le conduit hépatique & cystique; dans la suppression des règles &c. Mais dans ces cas là, on doit préférer le trôt du cheval, parceque la force de ce mouvement agit principalement sur le bas ventre.

La principale indication dans la cure d'une vomique est d'en procurer la rupture dès qu'on s'en apperçoit; afin que ne lui laissant pas faire de plus grands progrès, elle puisse se rompre dans le pœumon, & se vider par l'expectoration; au lieu que, si on attendait qu'elle s'ouvrit dans la cavité de la poitrine, le pus s'épandant dans cette cavité, l'étouffement pourrait s'ensuivre, & peut être n'aurait-on pas le tems de faire l'opération de l'empyème. Dans le premier cas, l'exercice à cheval est propre à satisfaire à l'indication de la rupture de la vomique, par les secousses que cet exercice procure à la poitrine.

Il ne suffit pas toujours pour la guérison qu'on ait rendu le pus contenu dans l'abcès du pœumon; pour peu qu'il en reste, il s'ensuit d'autres accidens, tels que l'éthisie, &c. qu'il est important de prévenir, en entretenant l'expectoration. Ainsi outre les remèdes généraux, l'exercice à cheval, surtout le trôt de préférence au pas, si les forces le permettent, doit être continué jusqu'à parfaite guérison; en observant de faire usage de cet exercice le matin, parceque les crachats aiant acquis une certaine coction pendant la nuit, l'expulsion de la matière purulente en sera plus facile, d'autant plus que l'air du matin, sans cesse renouvelé par le mouvement, devient en même tems un bon antiseptique & un excellent détensif.

L'équitation est encore bien indiquée dans la pluspart des autres maladies de la poitrine, comme dans la cure de l'asthme humoral & convulsif, dans la phtisie pulmonaire commençante, dans la consommation, dans les toux opiniâtres, &c. On sait même que les remèdes les mieux indiqués sont le plus souvent sans succès, si l'on n'y joint l'usage de cet exercice. L'expérience avoit appris à Sydenham à faire tant de cas de l'équitation, qu'il la croyoit propre à guérir sans autre secours, des maladies désespérées; telles que la consommation, la phtisie, pourvu que le ~~dévolement~~ dévolement, si fatal dans cette circonstance, ne fût pas encore parvenu au point d'occasionner des sueurs nocturnes; il a dit même que celui qui pourroit en faire un secret, deviendrait trop riche.

En effet le mouvement doux & répété que cet exercice excite, est propre à rétablir les sécrétions qui sont en défaut; en agitant le sang dans le

pœumon,



poûmon, il est capable de détruire les obstructions & de déterger les petits ulcères qui commencent à s'y former. En outre l'air vif et renouvelé que l'on respire à la campagne, & sur le bord des rivières, où l'on prend ordinairement cet exercice, tantôt sur une colline, & d'autres fois sur des montagnes dont l'air épuré n'aide pas peu au rétablissement; L'odeur des plantes, la diversité des objets dont l'oeil est frappé, le spectacle récréatif & merveilleux de la nature qui s'offre sans cesse, contribuent aussi pour beaucoup à chasser de la poitrine la matière purulente, à donner plus d'activité aux remèdes, à broyer & à diviser les liqueurs et la limphe épaissie dans la texture molle & flasque des poûmons; enfin quelquefois la résolution des tubercules & la guérison.

Il y a des auteurs qui, espérant encore des effets plus marqués des exhalaisons qui sortent de la terre nouvellement labourée, prescrivent aux phtisiques de suivre à cheval les nouveaux sillons formés par la charrue. Cet avis a de l'analogie avec ce que Wansvieten dit des bains de terre & des exhalaisons qui s'en élèvent.

L'Équitation est encore propre à satisfaire à l'indication qu'on a de déterminer la sortie des corps étrangers introduits dans l'estomach, soit par témérité, par imprudence, ou par accident. On sait qu'il est important de ne pas laisser séjourner, que le moins possible, ces corps étrangers, pour prévenir de plus grands accidents. On sent après comment l'exercice à cheval peut agir dans ce cas là, pour dégager le corps étranger; mais avant que de monter à cheval, on doit tous les jours prendre un lavement pour qu'en entraînant les matières, on facilite l'ouverture du passage au corps étranger. Dans ce cas là, le pas du cheval doit être préféré au trot & au galop, dont les secousses vives & fortes, pourraient exciter des déchirements ou des contusions aux parties exposées au choc du corps étranger. Enfin il vaut mieux prendre cet exercice le matin; & il faut le continuer jusqu'à ce que le corps étranger soit sorti.

C'est ainsi que M. Vigne chirurgien major des gardes du corps à Amiens, s'est conduit avec succès, à l'égard d'un officier qui avait avalé un écu de 6^e qui ne parvint aux intestins qu'après avoir causé les accidents les plus inquiétans, et sortit enfin par le secours de l'exercice du cheval au pas. *

En faisant sentir la nécessité de satisfaire par l'exercice à cheval, aux indications curatives des maladies, qui attaquent les hommes, nous n'avons garde de ne pas comprendre les femmes sous cette dénomination. Le mouvement leur est aussi également naturel. Ce n'est que par la réserve de l'éducation des filles qui les empêche de suivre aussi librement, le penchant que la nature leur a donné pour tous les mouvements précipités. Mais lorsque l'équitation est indiqué dans la cure de certaines maladies des femmes, nous pensons qu'il ne faudrait pas qu'elles se tinssent à cheval comme les hommes, cela serait trop froissant; il vaudrait mieux, ce semble, qu'elles y fussent assises les deux jambes d'un même côté, & les pieds appuyés sur un large étrier.

* Voyez cette observation insérée dans la gazette salulaire. année 1774.

61

Article particulier,
Des indications des voyages de Long cours.

Nous ne devons point passer sous silence les avantages que les malades éprouvent pendant les voyages de long cours, qu'on leur prescrit, soit en litière, en voiture, à cheval, ou à pied, suivant les forces & les circonstances.

Il est certain qu'on peut en espérer beaucoup, par le changement d'atmosphère & que l'éloignement des affaires de famille, l'agrément & la dissipation qu'on éprouve dans de tels voyages contribuent infiniment à rétablir les fonctions de l'économie animale. Car on sait que la gaieté, le bon air, l'air libre, l'exercice, sont surtout l'ame de la santé.

Ces sortes d'exercice sont bien indiqués dans la cure de la phtisie pour achever de résoudre les tubercules du pœumon; après la guérison de l'empyème; & dans la pluspart de ces maladies chroniques, qui ont pour cause des humeurs en stagnation et confondues dans quelques uns des viscères du bas ventre, &c. &c.

On se rappelle avec plaisir la ruse de M. Dessault, célèbre Médecin de Bordeaux (Si je ne me trompe), qui envoyait fort au loin des malades languissans, sous le prétexte de leur faire prendre des eaux minérales. Entr'autres, il envoya aux eaux de Spa, un malade qui avait beaucoup de confiance en lui. à peine y fût-il arrivé qu'il reçut une lettre de son Médecin, par laquelle il lui marquait qu'après avoir réfléchi plus mûrement sur son état, il jugeait que les eaux de Spa ne lui convenaient plus, & qu'il fallait aller promptement à celles de Bâges. En y arrivant autre lettre du Médecin, qui l'avertissait, en vertu d'une nouvelle consultation faite sur sa maladie, de se rendre sans délai aux eaux de St amand; mais le malade écrivit en chemin à son Médecin, qu'il n'avait plus besoin d'eaux minérales & qu'il retournait bien guéri. C'était justement ce qu'attendait son Savant Esculape.

C'est encore ainsi que M. Tronchin sous l'image agréable du jeu, ou sous celui du travail même, a fait sentir plus d'une fois à des femmes de qualité la nécessité de l'exercice. Aux unes il prescrivait le jeu du billard, l'équitation ou quelque voyage; il imposait aux autres, de frotter leur appartement, de scier du bois, de bêcher la terre; & souvent il réussissait par là à déraciner des maladies très opiniâtres.

Mais malheureusement il existe encore dans le public beaucoup d'erreurs & de préjugés sur les secours de l'hygiène en général. Il est souvent plus difficile aux gens de l'art de faire sentir à leurs malades la nécessité de s'astreindre à des règles, peut-être trouverons nous autant de difficultés à leur faire faire usage de la Gymnastique Chirurgicale, parcequ'ils n'ont de confiance qu'aux médicamens intérieurs & aux topiques, &c. &c.

Voyons maintenant si, au défaut de ces differens exercices, la Chirurgie ne peut pas tirer parti des frictions, & des changemens de lieu & de situation,

Fin
De la premiere Partie.



Seconde Partie

Des Frictions.

On entend par friction, l'action de frotter quelques parties du corps humain, — Soit avec la main, une éponge, de la flanelle, du linge neuf, une brosse, de la toile de crin &c. La friction est une espèce d'exercice, appartenant à la Gymnastique Médicinale. Aussi est elle comprise dans la Classe des exercices nécessaires à la Santé, & mise au rang des six choses non-naturelles.

Les Anciens, qui en connaissaient toute l'utilité, employaient la friction, non-seulement comme un remède, mais comme un moyen journalier de conserver la Santé. On en avait presque entièrement perdu l'usage jusqu'au milieu du dernier Siècle, — que les Anglais le rappellerent. Ambroise Paré est peut être le premier, qui ait employé ce remède dans la cure des maladies chirurgicales.

Il y a deux sortes de frictions, les sèches et les humides. Les sèches se font avec les mains seules, ou avec des linges chauds, &c. Et ces linges sont quelques fois imprégnés de la fumée de quelque gomme ou résine. Les frictions humides se font avec des huiles, des linimens, des onguens, &c. telles sont les frictions mercurielles.

En général, les frictions occasionnant une compression & un relachement alternatif des parties extérieures, elles excitent un mouvement dans les solides & les fluides; en animant la circulation, elles produisent une chaleur qui résout & atténue les humeurs, *; elles débouchent les pores de la peau, & les préparent à recevoir les médicaments convenables qu'on veut faire passer dans la masse du sang; enfin elles fortifient & procurent à peu près le même effet que les exercices modérés. ainsi les frictions peuvent suppléer à l'exercice, dans les cas, où les personnes qui, à raison des circonstances particulières, ne peuvent se promener, ni faire quelques uns des exercices convenables à leur Santé.

* La rougeur & la chaleur des parties qu'on frotte, l'accélération du pouls, — prouvent manifestement que le mouvement des humeurs est augmenté dans les vaisseaux de la peau. D'où il suit qu'on peut par les seules frictions augmenter l'action vitale, ad libitum, sans l'introduction d'aucun médicament. aussi des frictions faites sur l'abdomen donnent elles des effets merveilleux dans les cas, où il y a inertie dans les viscères.

En effet si, tous les matins, dans le lit, on se frotte l'estomach & le ventre avec de la flanelle, on augmente la circulation dans tous les viscères du bas ventre, on prévient les engorgemens, on dissipe même ceux qui ont déjà commencé à se former, on fait couler la bile, on facilite les sécrétions, on rétablit les digestions. Si l'on frotte tout le corps, on favorise la transpiration & l'on anime toute la circulation. Enfin les frictions d'une longue durée, — peuvent tellement la hâter, qu'on donnerait une fièvre ardente en les continuant trop longtems.

Les frictions ont des effets différens, suivant leur espèce & leur différence. Mr Louis * remarque qu'Ambroise Paré dans son introduction à la Chirurgie, réduit toutes les espèces de frictions, à trois, Sçavoir, la forte, la douce et la modérée.

Dans la première, on frotte rudement les parties, soit avec la main, soit avec de la toile neuve, des éponges, du crin, &c. La vertu de cette sorte de friction est de resserrer & de fortifier les parties que l'on y soumet. Si on la réitère souvent, et qu'on frotte assez longtemps à chaque fois; elle raréfie, évapore, résout, exténue & diminue la substance des parties: elle fait révulsion, dit Ambroise Paré, et divertit la fluxion des humeurs d'une partie sur une autre. Nous remarquerons que cette friction agit sur les veines et les artères en les comprimant.

La friction douce ou légère a des effets différens: elle ne comprime que les veines, elle amollit et relâche; elle rend la peau douce & polie, pourvu néanmoins qu'on emploie assez de tems à la faire; car celle qui servirait d'une trop courte durée servirait absolument sans effet; enfin elle ouvre les pores, & les prépare à recevoir les médicamens qu'on se propose d'y faire pénétrer.

La friction modérée tient le milieu entre les deux autres; elle attire le sang & les esprits sur la partie.

Précautions nécessaires pour assurer le succès des frictions.

En général les frictions exigent les mêmes précautions, pour être administrées sagement que les autres exercices. 1° Il faut être attentif au tems, à la qualité, & à la réitération convenable. Toutes ces choses doivent être soumises à des indications raisonnées sur l'état de la personne & sur l'effet qu'on se propose d'obtenir des frictions.

2° On conçoit que le degré de force qui établit la différence des trois espèces de frictions, doit être relatif; car celles qui seraient modérées pour une personne très robuste, pourraient être trop violentes pour une personne délicate. C'est pourquoi il faut avoir égard à l'âge, à la constitution naturelle des parties plus ou moins tendres & sensibles, & à la finesse de la texture de la peau. Il faut aussi dans certains cas procéder par degrés, & ne pas commencer par des frictions trop fortes.

* Voyez Journal de médecine. T. V. p. 207. Nous avouerons sans peine que nous nous sommes approprié ici la doctrine de Mr Louis sur les frictions, en lui donnant toute l'étendue que la pratique des grands Maîtres & nos propres réflexions ont pu y ajouter. Nous espérons que l'Académie se formalisera d'autant moins de cette espèce de plagiat, qu'elle est aussi persuadée que nous des talens supérieurs du guide que nous avons choisi.

* * Montesquieu dit quelque part, qu'il faut écorcher un Moscovite pour lui donner du sentiment. L'application de ce mot est aisée à faire ici, et la conséquence qui en résulte, non moins facile à tirer.



3° Le nombre des frictions que l'on doit faire à une personne, ne peut être fixé; cela dépend des forces: car il suffira d'en faire 50 à une personne fort faible, tandis qu'on pourra en faire jusqu'à 200 à une personne plus forte. Aussi en fait-on moins à une femme qu'à un homme; moins à un enfant ou un vieillard, qu'à un jeune homme. Enfin si l'on ne frotte que certaines parties, la friction doit être forte & durer longtemps; — puisqu'il est impossible d'affaiblir promptement le corps en ne frottant qu'une partie, soit qu'on veuille dégager la partie même sur laquelle on fait des frictions, soit qu'on veuille en débarrasser une autre. Mais si la faiblesse de tout le corps demande qu'on emploie également par tout la friction, elle doit durer moins de tems & être plus légère.

4° Quelques personnes sont dans l'usage de se faire frotter le matin et le soir avec une brosse, pour ouvrir les pores & faciliter la transpiration. Il est bon d'observer que les frictions du soir sont plus salutaires; parcequ'en se couchant immédiatement après, la chaleur du lit entretient l'effet de la friction: Mais si c'est le matin, il faut éviter de s'exposer à un air trop froid ou trop humide pendant l'usage des frictions; Il convient aussi de faire chauffer l'appartement dans lequel on se fait frotter, afin que la transpiration que l'on a disposé à se faire, ne soit pas subitement ralentie & interceptée par l'air froid, lorsqu'on frotte une autre partie. C'est pour — cette raison que les Anciens faisoient leurs frictions dans une étuve.

5° Enfin lorsque pour des raisons particulières, on se frotte le ventre, il vaut mieux le faire étant à jeun, & dans certains cas, il faut attendre que les premières voyes aient été dégagées, c'est à dire, que l'estomach & les intestins soient suffisamment désemplis. C'est l'avis de Galien. *De Sanitate tuenda. lib.*

Indications des différentes espèces de frictions.

Les Anciens employaient avec utilité les frictions un peu fortes dans les maladies, qui avaient pour cause la suppression de la transpiration. Ainsi lorsqu'on s'aperçoit par la sécheresse de la peau, que la transpiration est — arrêtée dans quelque partie du corps, il vaut mieux, d'après leur exemple, — satisfaire à l'indication de déboucher les glandes, par des frictions universelles ou locales, & rétablir ainsi l'ordre naturel, que de troubler l'économie animale par des saignées, ou par des remèdes pharmaceutiques, &c. &c.

Les frictions fortes sont encore bien indiquées dans les rhumatismes, dont la cause prochaine paraît être un engorgement dans les artères lymphatiques des membranes qui enveloppent les ligamens des articulations.

- „ J'ai vu, dit Mr Louis, *, des rhumatismes & autres douleurs fixes,
 „ qu'aucun remède n'avait soulagées céder à ces frictions. Elles sont très
 „ efficaces pour fortifier les parties sur lesquelles il se fait habituellement
 „ des fluxions: Par cette raison, elles sont un moyen utile dans la cure —
 „ préservatrice des Sciatiques & autres maladies du genre gouteux et
 „ rhumatisant, fort sujettes à récidives. „

* Voyez Journal de Méd. &c. T. V.

Nous remarquerons que la plupart des gouteux, &c, n'ont pas trop de confiance à ce remède qui leur paraît trop simple. Soit qu'on l'ait employé pour eux dans le tems de l'inflammation, (ce qui ne doit pas se faire, dans la crainte d'augmenter les douleurs), soit qu'on ne l'ait pas continué assez longtemps pour qu'ils en ressentissent du soulagement, ils ont conçu pour cette sorte de remède une espèce de mépris. — Mais les vrais Praticiens assez convaincus du succès & de l'utilité des frictions pour engager leurs malades à en faire usage; leur recommandent avec raison de se faire frotter avec des linges imprégnés de la fumée de quelques aromates ou de quelque linimens. Recommandation, qui prouve moins la confiance qu'ils ont à ces fumées accessoires, qu'àux frictions en elles mêmes. Mais il faut sçavoir condescendre à la faiblesse et aux manies des malades.

„ Les plus grands Maîtres ont conseillé, dit M^r Louis, dans la cure de la „ Léthargie, des frictions sur l'occipital & le cou, dirigées de haut en bas. Elles doivent „ être d'autant plus fortes, que l'assoupissement est plus profond. „

Ce même auteur prétend avec raison que les frictions très fortes sont — capables de réveiller d'un assoupissement apoplectique, & il les préfère aux fers rouges, que Lancisi, dans ce cas là, recommande d'approcher des pieds d'un — apoplectique; à l'eau bouillante, à la cire d'Espagne brûlante, à la mèche allumée sur les mains, les bras ou autres parties du corps que M^r Winslow* propose. M. Louis rapporte l'observation, [tirée des éphémérides de l'Acad. des curieux de la nature], qu'un Médecin ayant soupçonné qu'un homme qui était sans pouls et sans respiration, n'était pas mort, fit frotter la plante des pieds de cet homme pendant trois quarts d'heure, avec une toile de crin pénétrée d'une saumure — très forte, & que par ce moyen, il le rappella à la vie.

Lorsqu'il est question de rappeler les noyés d'une mort apparente à l'exercice des fonctions vitales; la principale indication est d'exciter l'action des vaisseaux, de prévenir la coagulation des liqueurs, & de leur donner du mouvement. — Dans ce cas là, les frictions fortes faites avec des flanelles ou des serviettes chaudes sur la surface extérieure du corps des noyés, sont un des principaux secours qui ont le plus de vertu pour remplir les indications, en observant — qu'elles doivent être augmentées, à mesure que les noyés donnent quelques signes de vie.

On dit que la fièvre emporte la paralysie à laquelle elle succède; mais il faut entendre ceci plutôt d'une fièvre artificielle que d'une fièvre naturelle. Or nous entendons par une fièvre artificielle, une augmentation du mouvement du sang, produite par art & en conséquence de laquelle la circulation se fait plus promptement; & les sucs en stagnation aux environs des nerfs & de leur origine, sont distribués, et, pour ainsi dire, repompés.

D'après ce que nous avons dit plus haut, on parviendrait à procurer une fièvre artificielle, par les frictions. Elles paraissent donc bien indiquées dans la paralysie où il y a privation totale ou particulière du mouvement et du sentiment volontaires, en conséquence du relâchement des parties nerveuses et musculaires.

* Voyez la thèse de M. Winslow sur les signes de la mort, que M. Louis a inséré et traduit dans son ouvrage qui a pour titre, la certitude des signes de la mort.



musculaires: Car l'expérience fait connaître que les frictions faites aux membres paralytiques avec une brosse rude, ou avec des étoffes de laine, continuées jusqu'au point de rougir la partie, ou faites avec des stimulans, ont été d'un usage salutaire dans la cure de cette maladie.

On excite une force électrique en frottant certains animaux, comme on l'observe sur les chats. C'est peut être en grande partie à cela qu'est dû le succès de la friction faite aux paralytiques. Les Anciens donnoient des frictions violentes avec des linges rudes, à la partie affectée; ou si la sensation était annihilée, ils irritaient la peau avec des orties, c'est ce qu'ils appellaient fustigation. Il paraît que leur but était de réveiller le sentiment en animant la circulation.

Les frictions doivent être appliquées sur les endroits où peut être le siège de la paralysie; mais si elle est générale, on doit les employer sur les parties où les nerfs sont plus gros, & plus près des tégumens, comme sur la tête, sur le cou, particulièrement tout le long des vertèbres cervicales, sur les orbites, derrière les oreilles, tout le long de l'épine du dos, aux aisselles, aux aines, aux jarrets, &c. &c.

Il suit encore des effets de la friction forte, qu'étant faite sur le corps d'une nourrice, que son lait peut recevoir plus d'action par ce moyen: Elle est principalement indiquée lorsque l'enfant d'une nourrice paraît languissant, menacé du rachitis & qu'il est malade des dents. Il en est du lait dont il s'agit, comme du lait des animaux; celui d'ânesse, celui de chèvre, celui de vache, sont beaucoup plus sains, lorsque ces animaux ont été brossés. Leur lait pèse moins sur l'estomach des malades qui en usent, & est moins sujet à s'y coaguler. Le goût est même si différent, comme l'observe Vanhelmont par rapport à l'ânesse, qu'on peut reconnaître, si l'ânesse a été brossée ou non.*

La Friction légère est propre à satisfaire à l'indication qu'on a de résoudre l'extravasation du sang & de la limphe, causée par des contusions; pourvu qu'on l'emploie avant que l'inflammation ait paru, & qu'il y ait peu de douleur à la partie contuse: car cette pression douce, broyant & divisant le sang & la limphe coagulée, facilite l'entrée des humeurs repompés, dans les petits orifices des veines absorbantes. On sait qu'on peut augmenter l'efficacité des frictions en les réunissant avec les saignées & en fortifiant ces deux moyens l'un par l'autre: Les malades en effet retirent dans les pleurésies de meilleurs effets de la saignée, lorsqu'à mesure que le sang coale de la veine, on a soin de faire de légères frictions sur le côté douloureux.

On sait que les glandes en général & surtout les viscères du bas ventre sont plus exposés aux obstructions, que les autres, à cause de la lenteur de la circulation par la nature même des humeurs qui s'y séparent, surtout par celle de la bile susceptible d'épaississement, & que les glandes mésentériques n'en sont pas plus exemptes dans les maladies scrophuleuses.

* *Asina pectenda est instar equorum. Ex lactis gustu dignosci potest, an asina pecta fuerit isto mane, nec-ne. /*

L'indication curative est, dans ces cas là, de faciliter la circulation, de résoudre l'humeur épaissie, &c. Aussi les frictions douces sont elles propres à y satisfaire, — ou tout au moins pour seconder l'efficacité des autres remèdes: Mais ce n'est qu'autant que la matière obstruante a acquis le degré de coction nécessaire, qu'elle est mobile, & qu'elle ne croupit qu'en conséquence du relâchement du tissu des fibres qui n'ont pas la force de s'en débarrasser, & par le défaut de ressort des viscères, que les frictions douces peuvent être employées avec fruit.

Wansvieten * dit avoir vu une parotide fort gonflée & très dure — longtemps combattue & sans succès par les remèdes en apparence les plus forts & les plus efficaces, céder enfin peu à peu & se résoudre, en l'exposant deux fois par jour à la vapeur de l'eau tiède mêlée et battue avec le vinaigre, et en y faisant ensuite des frictions, d'une heure chaque fois, avec de la flanelle. Il ajoute, qu'on a appliqué aussi heureusement une pareille méthode à des glandes scrophuleuses du cou, rebelles à tout autre remède.

Les sortes de frictions, si elles étaient employées dans le traitement de l'emphyseme, feraient sortir du tissu cellulaire la matière élastique qui en distend les cavités. Elles sont également propres à dissiper l'enflure édemateuse causée par l'amas des sucs lymphatiques & séreux qui crouissent dans le tissu cellulaire. — Accident qui est assez ordinaire à la suite des plaies d'armes à feu.

„Elles produisent encore un très bon effet, dit M. Louis, sur les membres „débilités par la gêne & la contrainte qu'ils éprouvent de la part des bandages „& par l'inaction, pendant le tems de la cure des fractures, des grandes plaies, &c.”

Ces frictions douces avec des linges mollets ou des éponges fines, peuvent encore suppléer au défaut d'exercice qui serait nécessaire aux blessés. Elles ont parfaitement réussi à Ambroise Paré, dans le traitement du Marquis d'Harvey, qui était réduit à la dernière extrémité, à la suite d'un coup de feu, reçu sept mois auparavant, & qui avait fracturé l'os de la cuisse. Dans cette cure, l'une des plus belles qu'on ait faites en ce genre, Ambroise Paré prescrivit des frictions avec des linges chauds sur la partie, pour favoriser l'opération des remèdes capables d'atténuer & de résoudre l'engorgement du même blessé; & il en faisait faire le matin d'universelles, c'est à dire, sur tout le corps, „qui était, dit le „Bére de la Chirurgie française, grandement exténué & amaigri par les „douleurs et accétons, & aussi par faute d'exercice.”

Les grands Praticiens s'accordent tous à dire avec M. Louis, que les frictions modérées faites avec des linges chauds & assez longtemps, préparent utilement à l'efficacité de l'application des ventouses, des vésicatoires, & des cautères potentiels, à celle des fomentations résolutives, des emplâtres de même vertu, & de tous les remèdes incisifs ou stimulans, dont on se sert sur les tumeurs oedémateuses, & autres congestions de matières fétides & indolentes qu'on veut échauffer.

Les frictions modérées doivent également précéder l'usage des douches résolutives qu'on emploie dans la cure de l'anchilose, &c.; afin que les parties pénétrantes qui sont dans l'eau, puissent être introduites jusques dans le tissu



Le tissu de la partie malade, & que la chaleur de l'eau qui s'y communique puisse l'échauffer jusques dans le profond de l'articulation.

L'Anchilose est non seulement à craindre à la suite des fractures, des entorses, du gonflement des os, mais aussi par la goutte, le virus Scrophuleux, vénérien, &c. &c. par les dépôts purulents, par les vices de la Sinovie, & à la suite de l'hydrocèle de l'articulation. On sent assez l'indication de la prévenir dans quelques-unes — des autres articulations: car le mal se communique d'une articulation à l'autre. C'est alors que les frictions modérées doivent être mises en usage sur toutes les jointures; mais il faut les continuer longtemps pour en retirer du succès, — puisqu'elles résolvent souvent la Sinovie; les pores absorbans se r'ouvrent, & la Sinovie peut être reponpée dans la masse commune des humeurs. Outre cet avantage, les frictions en ont un autre qui est réel, c'est celui de donner un plus libre passage aux particules des topiques dont on se propose de couvrir l'articulation.

Il est assez ordinaire de faire des frictions sur les parties qui ne sont point malades. On fait, par exemple, des frictions sur les extrémités inférieures, — lorsqu'on veut dégager les parties moyennes ou supérieures du corps, pour exciter une dérivation vers les parties inférieures. On a quelques fois réussi à rappeler la goutte dans les extrémités inférieures, en les frottant modérément depuis les pieds jusqu'à la moitié des cuisses, avec une flanelle douce, de trois en trois heures chaque fois.

C'est avec succès qu'on a fait des frictions aux pieds des asthmatiques, qui sont presque toujours froids, pour déterminer les humeurs vers les parties inférieures & pour rétablir la circulation dans son état uniforme & naturel: d'ailleurs les frictions calment encore les spasmes.

Les frictions, que l'on ferait sur les articulations pendant la cure de l'esquinancie, seraient avantageuses: car le relâchement qui accompagne la transpiration qu'on occasionne par ce moyen, se communique aux parties affectées.

Lorsqu'il arrive quelque désordre dans l'économie animale par la rétroimpulsion d'une maladie cutanée, il est important de travailler au plutôt à faire reparaître la maladie: On y réussit quelques fois, en frottant le membre avec des linges bien chauds.

Ambroise Paré * recommande l'usage des frictions sur tout le corps, — pendant la cure des plaies à la tête. „ Il convient, dit-il, de faire des frictions „ assez longues et fortes, universellement par tout le corps, excepté la tête; tant „ pour faire révulsion des matières qui pourraient monter en haut, lesquelles „ s'augmentent fort par faute d'exercice. „ André de la Croix, **, donne à cet égard le même conseil.

*. Oeuvres de chir. ambr. Paré. Chap. 14. liv. 10.

** at exercitii loco ut vapores aversionis gratiâ remeantur, leves frictiones & his partibus, quæ longius à vulnere absunt, antè cibum & evacuato ventre commendantur. Chirurgia Joan. Andr. a Cruce. De Regimine fracturarum calvariae in sex reb. nonnaturalib. Cap. VI.

On sait que dans le frisson, il convient d'accélérer le mouvement du sang, non par des cordiaux, mais par des frictions chaudes, lesquelles sont très bonnes, surtout dans les frissons qui durent longtemps, & qui mettent les malades en péril par leur longueur. Elles sont également propres à rappeler la chaleur des extrémités froides: accident qui accompagne assez ordinairement les fièvres continues.

On ne sent pas moins la nécessité de réchauffer, par des frictions modérées, les pieds lorsqu'ils sont froids, avant que d'y pratiquer la saignée: Sans cette précaution, il y aurait du danger de les plonger tous froids dans l'eau chaude.

„ Dans les sueurs qui arrivent spontanément, ou par l'action des remèdes -
 „ sudorifiques, aussi bien que dans celles que procure un exercice violent, tel que le jeu de la
 „ paume, il est convenable, dit M. Louis, avant de changer de linge, de se faire essuyer
 „ et frotter modérément avec des linges chauds. Cette friction non seulement nettoie le
 „ corps, en absorbant l'humidité qui le mouille, mais elle fait sortir & exprime
 „ des pores de la peau des restes de sueur & des sucs excrémenteux qui y ont été
 „ portés, & donne du ressort aux parties; aussi remarque-t-on que ces frictions -
 „ préviennent la lassitude. „

Enfin dans le déplacement des muscles, * il suffit quelques fois, suivant M. Pouteau, de faire de fortes frictions, sur la partie malade, avec la main, ou avec une boule de linge fin, pour parvenir à la réduction; en observant de mettre le muscle déplacé dans le relâchement & de faire faire au malade de légers mouvements.

Nous pourrions encore joindre à l'exposé des frictions, l'action de peigner, pectinatio, que l'on recommande comme une espèce de friction, qui ne peut être que très salutaire. Sans compter qu'en emportant la teigne, les gales, & les ordures de la tête, elle prévient les obstructions des pores de la peau.

D'après cela on peut aisément tirer les indications de l'action de peigner, auxquelles nous ne nous arrêterons pas.

* Ce n'est pas ici le lieu de nous arrêter aux causes du déplacement des muscles & à la manière dont ils se déplacent. Si nos lecteurs étaient curieux de s'instruire à cet égard, nous les renvoyons à l'excellent Mémoire que feu M^r Pouteau a composé sur cet objet.

Fin
 De l'exposé des frictions.



Du Changement de lieu et de Situation.

Nous entendons par changement de lieu, l'action de sortir du lit les malades; & par changement de Situation, l'action de soulever le corps ou quelqueune de ses parties pour lui donner une situation — différente de celle qu'il avait auparavant.

La Pratique fait assez connaître que les malades reçoivent un très-grand soulagement, en bien des cas, lorsqu'on les tire de leur lit le matin. Plus leur complexion est délicate, plus ils sont affaiblis par la maladie, et moins le séjour dans le lit leur est profitable; Car le repos énerve les solides & fait stagner les humeurs; les forces, & l'action vitale. Si nécessaires à la guérison, ne peuvent se rétablir — par l'inaction; & s'ils y restent trop longtemps, le sang s'altère, les parties excrémentitielles restent dans le tissu de la peau, et dévorent l'économie animale.

Le renouvellement de l'air de la chambre où l'on a dormi serait d'un faible secours, si on laissait le corps entre les draps et sous les couvertures imprégnées de l'humidité de la sueur & de la transpiration. Nous avons déjà eu occasion de dire que les influences de l'air du matin donnaient du ressort aux fibres, & qu'elles préparaient aux grandes évacuations. Elles sont plus promptes & plus faciles quand le corps a changé de lieu & s'est procuré une atmosphère nouvelle.

Mais l'avantage le plus ordinaire que les malades retirent du séjour hors du lit, c'est que les urines coulent plus abondamment et avec plus de facilité. Au lieu que le trop long séjour dans le lit, est nuisible au cours des urines, obstrue, enflamme les reins, & s'oppose non seulement à la sécrétion, à la filtration, mais encore à l'excrétion de l'urine; d'où peuvent naître la mucosité, le gravier, la pierre, &c. &c.

L'Observation suivante* fournit la preuve de ce que nous avançons. Mr B..... fût appelé pour voir un jeune homme attaqué d'une rétention d'urine, l'hypogastre était peu tendu, le malade avait cependant de fréquentes envies d'uriner, il rendait quelques gouttes

* Nous avons recueilli cette observation, des leçons de M. B. Professeur aux écoles de chirurgie de Paris, dans le temps que nous y faisons nos études.

divines avec beaucoup d'efforts; M. B. introduisit sans peine la sonde dans la vessie, il sortit de l'urine claire d'abord, elle devint peu à peu trouble, & enfin si épaisse qu'elle cessa de couler, quoiqu'il eût lieu de croire que la vessie était vidée: Cependant le malade continua d'avoir des contractions fortes de vessie, & des envies d'uriner; Ces accidens devaient faire juger qu'il y avait un corps étranger dans la vessie, il n'en reconnut point, il ôta la sonde pour s'assurer si ce n'était pas la présence qui causait ces contractions de vessie; elles n'en continuèrent pas moins. Cet état dura deux ou trois jours pendant lesquels on introduisit plusieurs fois la sonde & les choses se passèrent de même.

Le malade suait prodigieusement pendant tout ce tems là. On sait que le rein est regardé comme le vicar de la transpiration de la peau; — c'est, sans doute d'après cette idée, qu'il vint en pensée à M. B. que toute la sérosité d'excrétion s'échappant par les pores de la peau, les autres principes de l'urine faisaient un sédiment trop épais pour s'échapper par la sonde. En effet, il fit découvrir peu à peu le malade dans l'intention de ralentir insensiblement la transpiration; bientôt après le malade cessa de suer; on le fit ensuite sortir du lit et trois quarts d'heure après, les urines ayant repris leur cours, les accidens précédens cessèrent.

Cette observation & ce qui précède fait assez connaître l'indication du Séjour hors du lit, pendant la cure de la gonorrhée où l'on se propose, par les boissons amples, non seulement de diminuer l'action du virus, mais encore d'établir le cours des urines pour détacher & relâcher le canal de l'urèthre. Outre la nécessité de satisfaire à cette indication par le Séjour hors du lit, c'est qu'en évitant la chaleur du lit & la situation d'être couché sur le dos, on prévient ainsi, ou tout au moins on diminue la fréquence des érections involontaires.

Il en est de même à l'égard de la douleur néphrétique, dont les accidens peuvent augmenter par la chaleur du lit.

Les Rhumatisans & les gouteux se trouvent également bien de se tenir tous les jours, hors du lit pendant quelques heures; Sans cela la paresse dans laquelle ils croupiraient, rendrait leurs organes moins propres à digérer & à faire circuler les humeurs. D'ailleurs les douleurs rhumatisques sont plus vives dans le lit, que lorsqu'on est levé.

On se trouve ^{+ bien} après l'opération de la taille, lorsque les malades sont en état de se lever, de ^{+ bien} s'asseoir, ou qu'ils témoignent avoir envie de quitter le lit, de le leur permettre.



C'est encore dans le traitement des grandes playes du tronc, & des fractures compliquées des extrémités supérieures, qu'il est important de faire sortir du lit, les blessés, de les tenir levés quelques heures par jour, lorsque le tems des premiers accidens & celui des grandes suppurations sont passés. Si on les laisse languir dans le lit, leurs forces s'épuisent, le sang s'appauvrit, l'insomnie, l'inquiétude & l'abondance de la suppuration en sont la suite.

Pendant le traitement des fièvres & des maladies de langueur, les malades se trouvent bien de sortir du lit, & de rester levés, quelques heures dans le jour. Sydenham * louait beaucoup cette méthode, il la regardait comme le meilleur moyen d'abattre la fièvre, de diminuer le mal de tête & les rêveries.

Ainsi tant que les malades en auront la force & que les circonstances le permettront, il est nécessaire qu'ils se tiennent tous les jours hors du lit l'espace d'une heure ou plus, s'ils le peuvent. Cependant il faudrait éviter de les faire lever, pendant qu'ils auraient des sueurs de nature à les soulager. Mais dès que leur état le permet, il convient d'en profiter pour faire raccommoder leur lit tous les jours, pendant qu'ils sont levés; et l'on changerait les linges tant du lit que des malades.

Il est incroyable, quel bien, on peut, par cet exercice salutaire, procurer aux malades affaiblis; mais un préjugé pernicieux établit une pratique contraire: c'est une des contrariétés qu'éprouvent le plus souvent les gens de l'art, de la part des gardes malades, dont on a mille peines de se faire obéir.

Il m'est arrivé quelques fois de faire sortir du lit les malades, devant moi, & de faire raccommoder leur lit, afin d'être plus certain qu'on avait procuré cet exercice aux malades.

On hésite, on craint même de tirer les malades du lit; on les laisse dans des linges pourris, chargés de corruption, qui sont capables de donner un caractère de malignité à la maladie; L'on nous dit encore que le malade est trop faible. Nous avons démontré plus haut que le trop long séjour du lit affaiblissait ces malades; Il faut qu'ils soient presque mourans, pour ne pas soutenir cette opération, qui lors même qu'elle les affaiblit pour le moment, augmente leurs forces & diminue leurs malaises presque sur le champ.

* Si æger quotidie lecto abstinere saltem ad horas aliquot; vel si id vetaret major ejus debilitas, vestes saltem indueret, & supra lectam cubaret, capite paulò elationi, nullis stragulis tectus, ut grato hoc refrigerio nimius ardor compesceretur. Oper. Sydenh. Sect. V. Cap. II.

Du Changement de Situation

Il est des cas, où les malades sont contraints de demeurer immobiles dans leur lit, soit parce que le traitement des maladies l'exige, comme dans la cure des fractures, des luxations, des grandes playes, &c, soit lorsqu'ils sont atteints de la paralysie, ou qu'ils sont tourmentés des douleurs cruelles de la goutte, & qu'ils n'osent se remuer dans la crainte d'augmenter leurs douleurs.

Il est quelques fois impossible de transporter les malades de leur lit, sur une chaise longue; les frictions même ne pourraient suppléer à ce genre d'exercice salutaire. Il est donc nécessaire de prévenir s'il est possible, par le Changement de Situation, les accidents qui peuvent résulter de la gêne & de la compression des parties.

On voit souvent, surtout à la suite des plaies compliquées de la tête, de la paralysie, des fractures & des maladies aiguës, &c, — que les malades accablés tombent dans une espèce d'insensibilité & d'assoupissement, qui ne leur permet ni de sentir, ni de se plaindre des malaises & des douleurs anxieuses qu'ils souffrent. Tout le poids du corps presse alors le côté, sur lequel il est couché: bientôt il survient des accidents aux endroits, où les os font saillie, comme aux épaules, aux apophyses épineuses des vertèbres, à la pointe des fesses, aux trochanters, au talon, mais le plus souvent au coccyx, parce que les malades étant ordinairement couchés sur le dos, le lit s'affaisse au milieu, de sorte que presque tout le poids du corps est appuyé sur l'os sacrum & le coccyx, recouverts des seuls tégumens & d'un peu de graisse.

La pression, que ces parties éprouvent, est bientôt suivie de l'inflammation, de la gangrène & de la carie, si l'on n'y prend garde: Ces accidents arrivent plutôt, lorsqu'il y a déjection involontaire de l'urine & des matières fécales. Hippocrate * avait fait la même observation.

Dans ces circonstances, le changement de Situation est indiqué; Car il suffit seul pour prévenir tous ces accidents. En effet si

* Meminisse etiam debemus exculcerari ejusmodi partes,
Si diu in eodem habitu perseverent, & agerrime ad sanitatem
postea perduc. Tract. de fractur. hip.



plusieurs fois dans le jour, on délivre le malade de la compression des parties, la circulation s'y rétablira; d'ailleurs en ayant le soin que le corps soit à nud sur des alaises très douces & sèches, on évite par là les mauvais effets de la transpiration et de l'humidité des déjections putrides.

Mais si on a de la peine à changer souvent le malade de Situation, à cause de sa grande faiblesse, & s'il ne peut se soulever avec la corde du plancher, — [comme il y en a dans tous les lits des hôpitaux] pour lors il est possible de tenir le corps suspendu par des sangles, avec précaution; ou au moyen d'un — bourrelet de linge doux, d'y faire porter à faux les parties comprimées pour lesquelles on craint. C'est ainsi qu'Ambroise Paré, qui avait vu arriver de tels accidents, se fit soigner pendant le traitement de la fracture à la jambe.

M. Petit, dans son traité des maladies des os, dit, „ qu'on ne peut
 „ trop exhorter les chirurgiens qui seront chargés de ces funestes blessures,
 „ de tenir toujours leurs malades le plus proprement possible, de les visiter
 „ souvent, d'obvier à leurs besoins, & d'écouter patiemment leurs plaintes. „

Il ne suffit pas d'avoir porté notre attention sur les heureux effets du changement de Situation relativement au tronc; les extrémités — supérieures & inférieures étant blessées, & restant longtemps dans la même place sont susceptibles d'accidents; l'immobilité des articulations peut produire de la roideur dans les muscles & l'ankilose, &c.

Le prurit est le plus commun des accidents dans les fractures; la douleur qu'il cause est bientôt suivie d'inflammation & d'ulcération, si l'on n'y remédie. La multitude des blessés dans un hôpital est souvent cause que l'on ne peut tout prévoir; aussi remarque-t-on que ces accidents sont plus fréquents dans les hôpitaux qu'ailleurs, à cause de la malpropreté qui y donne lieu. En effet, la compression, les matières transpirables — retenues & échauffées, forment avec la crasse une acrimonie qui — enflamme & ulcère la partie.

D'après cela, on apperçoit bien l'indication de changer le membre de Situation, de le soulever quelquefois, dans la crainte qu'il ne ~~s'échauffe~~ s'échauffe & qu'il ne survienne inflammation. C'est pourquoi Ambroise Paré, * dit encore qu'il faut, dans ce cas, lever l'appareil de trois en trois jours, pour donner de l'air à la partie, & faciliter la transpiration.

„ Le Chirurgien doit pareillement prendre garde, continue ce Père —
 „ de la Chirurgie française, que la partie blessée ait souvent une —

* Voyez les Œuvres d'Amb. Paré, chap. v. liv. XV.

„ flabellation, afin qu'elle n'acquiere inflammation, aussi garder qu'elle ne soit
 „ ni trop couverte ni pressée. „

Il entend par flabellation le renouvellement de l'air sous un membre fracturé, ou son rafraichissement. „ La flabellation se fera, dit il, en ~~changeant~~
 „ changeant la partie de place & la soulevant par fois. Tel précepte n'est —
 „ Seulement à noter pour les fractures; mais aussi pour toutes parties blessées
 „ et ulcérées.

Le Seul changement de Situation ne remédierait pas aux suites fâcheuses d'une articulation, qu'on laisserait longtemps sans mouvement, pendant la cure des fractures & des grandes plaies des extrémités; l'amas de la Sinovie, son épaissement, l'ankilose, la roideur des ligaments, des muscles, &c. sont à craindre.

L'indication de donner du mouvement à ces parties, est assez sensible, lorsque les malades ne peuvent les mouvoir eux mêmes; puisque rien ne favorise plus la résorption de l'humour Sinoviale que le mouvement de la partie. — Mais avant que de satisfaire à cette indication, il faut avoir égard au tems & à la nature des mouvemens convenables aux différentes articulations: car ce n'est pas une chose indifférente.

Quant au tems propre à mouvoir les articulations disposées à l'ankilose, il ne faut commencer à les remuer que quand la violence des douleurs & le gonflement sont passés. Il serait dangereux de les mouvoir tant qu'elles persistent: car elles peuvent augmenter au point qu'il en arrive convulsion, défaillance & la mort même.

Quant à la nature des mouvemens: On doit commencer, 1° de mouvoir doucement les parties sans rien forcer, pour ne point attirer une nouvelle fluxion qui pourrait être plus fâcheuse que la première. 2° Dans ces tentatives de mouvement, il ne faut donner que celui que la construction de l'articulation permet; par exemple, on ne remuera en rond que les articulations par genou. On étendra, on fléchira seulement les articulations par charnière, se gardant bien de porter ces mouvemens au delà des bornes prescrites par la conformation naturelle.

Nos lecteurs se fatiguent déjà sans doute; ils sentent comme nous le besoin du repos. Examinons en donc les effets, pour en faire l'application aux maladies chirurgicales. /



Troisième Partie.

Du Repos.

Le repos du corps est la cessation du mouvement, que l'on a fait en se livrant à l'exercice ou au travail: c'est l'état opposé à celui de l'action qui opère ce mouvement.

Le Repos du corps est celui que l'on prend, lorsqu'on est couché, ou demi assis. Si les Sens externes ne sont pas troublés de la part des choses extérieures, c'est l'état du plus parfait repos du corps; à dire, celui où il n'y a d'autre action que celle qui vient des mouvements libres, doux, aisés des fonctions vitales.

Sous ce point de vue, nous examinerons les effets du repos, & les précautions qu'il convient de prendre pour en assurer le succès. Ensuite nous exposerons les indications, suivant lesquelles on doit prescrire l'usage du repos & de la Situation * du corps & de ses différentes parties, dans la cure des maladies chirurgicales.

Pendant que le corps se repose, les puissances motrices, qui le mettent en action, sont relâchées, la circulation se ralentit; d'où il s'ensuit une diminution de la chaleur naturelle; & si le corps est en repos dans une situation horizontale, la tête étant plus élevée que le tronc, le retour du sang qui vient du cerveau & des extrémités inférieures est alors plus facile. En un mot, le Repos répare les esprits dissipés; il ramasse & condense les parties gélatineuses du sang, il empêche leur trop grande évaporation, & délasse le corps fatigué.

Si le corps est dans le plus grand repos de la part des choses extérieures, et si l'esprit n'est point occupé, le calme survient & l'on est disposé au sommeil.

Mais le Repos doit être modéré, autrement il appesantit le corps, il énerve les solides, il épaisse le sang, cause des obstructions dans les viscères, &c. & dispose à des maladies dangereuses & opiniâtres: C'est pourquoi il y a des règles qui prescrivent les temps et la manière de prendre le repos. Elles

* Nous avons cru devoir parler de la Situation, conjointement avec le repos; parceque les solides pour être rétablis dans leur état, doivent être dans une situation naturelle & proclive; c'est à dire, dans celle où leur tension diminue, et que toute douleur, tout spasme, toute situation à charge & difficile, empêchent qu'on se repose.

Serviront de base aux précautions nécessaires que nous allons établir pour assurer le succès du repos.

On ne peut trop prendre de précautions pour faciliter le repos des malades. Il faut donc avoir égard 1° à ce que le cou & les poignets ne soient pas serrés; que les bandages ne compriment pas trop: ce serait mettre obstacle à la liberté de la circulation, donner naissance à des engorgemens; d'où ~~viendraient~~ s'ensuivraient des engourdissements, de l'inquiétude, l'œdème, &c. &c. - - -

2° Les malades ne doivent pas être couchés ni trop mollement, ni trop durement; les linges doivent être bien secs; il faut en changer souvent, ainsi que le malade de chemise: car il serait ^{+ de le laisser} dangereux dans des linges imbibés de sueur ou d'autres matières infectes. Il ne faut pas trop couvrir les malades en été. Il convient aussi que les parties blessées ne supportent pas le poids des couvertures.

3° Les membres doivent être dans une telle situation qu'ils soient à demi-fléchis, & également appuyés; car si quelqu'un doit porter à faux, les muscles feraient des efforts pour soutenir la partie malade; ce qui pourrait causer de la douleur dans les playes, ou déranger les pièces fracturées après leur réduction.

4° La façon de coucher les malades n'est pas indifférente. Ainsi dans les maladies de poitrine, le corps doit être un peu élevé pour faciliter la respiration. D'autrefois la situation d'être couché sur le côté est plus supportable. Dans d'autres circonstances, le corps ou ses parties doivent être situés de manière à faciliter l'écoulement des matières.

5° Le renouvellement de l'air de la chambre est utile dans tous les cas; ce serait une mauvaise pratique que de fermer totalement les rideaux du lit.

6° Quant un malade a été à la selle, il convient de faire emporter ses excréments. Il faut éviter la putridité de l'air & la corriger quand on s'en aperçoit. La fumée, les odeurs fortes & tout ce qui est capable d'irriter la membrane pituitaire est nuisible en bien des cas.

7° Il faut dans d'autres cas apporter ses soins du côté de la vue; ce serait la fatiguer que de laisser les yeux d'un malade exposés à la lumière, au feu, à la lueur du soleil, ou à d'autres objets de couleur rouge, &c. - - -

8° L'organe de l'ouïe demande les mêmes attentions, dans bien des circonstances, afin que les malades reposent tranquillement. Il faut qu'il y ait le moins de monde auprès d'eux, qu'on y fasse le moindre bruit

possible,



possible, que personne ne leur parle sans nécessité; car outre que le trop de personnes dans la chambre d'un malade, & surtout près de son lit, altèrent l'air, & en empêchent le renouvellement, c'est que la variété des objets occupe le cerveau, & peut en augmentant la fièvre, faire rêver les malades.

Autant qu'il est possible, on doit les éloigner du bruit, comme loin des cloches & de l'habitation des ouvriers, dont le métier est bruyant; Si c'est dans un couvent, les malades doivent être éloignés du chœur; Si c'est à l'armée, le bruit du canon est encore plus à craindre.

Il est facile de prévenir le bruit des charrettes, en faisant mettre de la paille aux environs du logement du malade. C'est pour prévenir, la douleur, la fièvre & autres accidens augmentés par le bruit, que les Anciens, quoiqu'ils ne connaissent pas la circulation, recommandaient dans toutes les maladies aiguës, un calme parfait, qu'ils éloignaient de leurs malades tout ce qui était capable d'affecter vivement les Sens, & qu'ils ordonnaient de les coucher dans des chambres obscures et écartées du bruit, pour leur faciliter le plus grand repos.

9° Le Repos ne doit pas être d'une trop longue durée, parce que la circulation, ne dépendant alors que des seules forces vitales, et étant privée des secours de l'action musculaire, elle devient alors languissante, & que les viscères ne sont plus arrosés par la même quantité de Sucs, d'où il arrive Stagnation des humeurs. Mais — Lorsque le traitement de certaines maladies exige un long repos du corps ou de quelqu'une de ses parties, il faut au moins changer les malades de situation & les faire mouvoir à chaque pansement, pour prévenir l'épaississement de la Sinovie, la rigidité des ligamens, l'ankilose, &c. &c. . . .

Indications Du Repos.

Avant que d'entrer dans le détail des indications du repos dans la cure des maladies chirurgicales qui affectent particulièrement la tête, le tronc & les extrémités, jettons un coup d'oeil sur la cure générale des plaies & des ulcères, dont la guérison peut être favorisée par le repos du corps et la situation convenable.

On sait que les plaies en général ne peuvent se réunir & se rétablir dans leur état naturel que par un contact immédiat & permanent, qui donne lieu au Suc nourricier de les coller ensemble pour en faire un corps continu. Mais pour satisfaire à cette indication, il faut nécessairement vaincre les puissances motrices en les mettant dans l'état de repos, et dans une situation méthodique, sans quoi le moindre mouvement de leur part détruirait les moyens de cohésion, et ferait manquer par là le procédé curatif, dont l'événement aurait été le plus heureux. D'ailleurs la situation de la partie blessée est encore nécessaire, tant pour prévenir l'engorgement oedémateux & faciliter le retour des liqueurs, que pour donner issue aux matières & aux corps étrangers.

Le plus grand repos de la part des choses extérieures, n'est pas moins important, surtout s'il y a eu hémorragie, & qu'on en craigne le retour; si la commotion a été générale, ou si la fièvre & d'autres accidents compliquent l'espèce de la plaie, &c. L'avis de Galien sert d'appui à ce que nous avançons. Quidquid in corpore dissectum est, id exquisitam integramque ex postulat requiem.

Ces indications du parfait repos sont surtout importantes dans la cure des plaies de tête; puisque par le peu d'attention de la part du Chirurgien, ou par la désobéissance des malades à garder le plus grand repos, ces plaies, qui ne seraient pas mortelles par leur nature, pourraient changer, au point de le devenir. André de la Croix * regarde les mouvements du corps comme très nuisibles; hipocrate ** ainsi que Galien *** prescrivent son plus grand repos pour le même objet.

La situation du tronc & de la tête n'est pas non plus une chose indifférente; car il faut ~~se~~ prévenir le séjour des matières, qui pourraient causer beaucoup de ravages dans les parties aponevrotiques de la tête.

* Universi corporis quales sint motus tum mentales, tum arbitarii licet minimi fuerint, ingenti existente calvariae fractura abigendi sunt, veluti in rigore contingit. Si quidem dum quiescit homo solam interdum inaequalitatem sentit, dum movetur, horrorem; dum vero exercicatur, vigorem

Ager parcius loquatur sermo namque prolixus & capitis inclinatio, visus & clamor his affectibus mirifice obest. Chirurg. Joan. And. a Cruce. Cap. VI.

** Quies ergo tanquam ad curationem necessaria, praesertim si magna sint vulnerata, conferre videtur. hip. tract. de vulnerib.

*** Ne humores ad loca vulnerata ut pote imbecilla transferantur.

Gal. aph. 4. Comment. 33.



Écoutez encore le précepte d'André de la Croix. *Vulnus in imâ semper et declivi parte quiescat, præter illud si magnum fuerit, quod in lateribus infigitur, ne quandoque cerebrum procidere possit. Reliqua verò talem situm exposcunt, ut excrementa, purulentaque materia facilius expurgentur.*

C'est ici le cas, plus qu'en aucun autre, où il faut apporter la plus grande attention pour satisfaire à l'indication du plus grand repos de la part des choses extérieures, & de prévenir tout ce qui serait capable d'exciter les mouvemens de la tête, quoique mise en repos, tels que les — Sternutatoires, les odeurs, la fumée, enfin le vomissement; et d'éloigner de la vue des blessés, la lumière, afin d'éviter de causer de l'ébranlement aux nerfs optiques. André de la Croix veut que le lit du malade soit placé à contre jour. C'est pour le même motif que Celse prescrit de coucher le blessé dans un lieu obscur et éloigné.* C'est ainsi qu'il s'exprime *Quiescat æger, in lecto valde molli, ac humili, et conclavi obscuro.* —

Ambroise Paré remarque plus particulièrement à l'occasion des plaies de tête, qu'il faut mettre le blessé en un lieu de repos & hors du bruit, autant qu'il est possible; comme loin des cloches & de la demeure des ouvriers dont le métier est bruyant; tels que les maréchaux, les tonneliers, &c. & les garantir du bruit des charrettes. Lorsqu'il était à l'armée, ce qui lui faisait le plus de peine, c'était qu'à chaque coup de canon l'hémorragie des blessés se renouvelait: ceux qui avaient des plaies à la tête en étaient le plus incommodés, tous les symptômes empiraient, et plusieurs malades en mouraient bien plus vite. —

„ Je me souviens, dit il, * * que quand j'étais au château d'hesdin,
 „ à l'heure qu'on faisait la batterie, le bruit et rétentissement de l'artillerie
 „ causait aux patients une douleur extrême, et principalement à ceux qui
 „ étaient blessés; car ils disaient qu'il leur semblait qu'autant de coups
 „ de canon qu'on tirait, autant on leur donnait de coups de bâtons sur
 „ leurs plaies; et leur survenait flux de sang par icelles, et faisaient grands
 „ pleurs et lamentations; de sorte que la douleur, la fièvre & autres —
 „ accidens étaient par telle véhémence, grandement augmentées, et —
 „ la mort accélérée. „

* Nous observerons en passant qu'il y aurait du danger de tenir dans les ténèbres un malade en délire: On a éprouvé manifestement que les malades en délire sont beaucoup plus tranquilles quand on fait ouvrir les rideaux de leur lit, afin qu'ils voient clairement ce qui les environnait.

En effet lorsqu'un délire n'est pas porté au dernier degré, plus on fortifie les impressions que les objets extérieurs peuvent faire sur les sens, plus — on a lieu d'espérer que les sensations vraies prévaudront sur les fausses — imaginations.

* * Oeuv. d'Ambr. Paré, liv. X. Chap. XIV.

Fabrice D'hilden * rapporte une observation, qui confirme celle D'ambroise Paré. Un jeune homme s'était brisé un des os parietaux; on en avait retiré quantité d'esquilles; la fièvre, la douleur & tous les autres symptômes avaient cessé; tout allait le mieux du monde; Le Pere de ce malade, contre la défense expresse de Fabrice D'hilden, — permit à des paysans en débauche de s'approcher de la chambre du blessé, battant la caisse, jouant de la flûte, dansant, &c. Le Sur lendemain le malade eut une fièvre des plus aiguës, le délire, des convulsions, des nausées, & il mourut le quatrième jour suivant. La chose aiant été rapportée au Magistrat, on fit payer au Pere une amende.

Les différentes indications du parfait repos dans la cure des plaies de tête sont à peu près les mêmes pour celles des maladies des yeux qui affectent cet organe intérieurement. Aussi a-t-on l'attention d'éloigner de ces malades tout ce qui pourrait exciter des secousses à la tête, comme l'éternuement, la toux, l'action de rire, la fumée &c. On a le soin de ne faire faire que petit jour dans l'appartement, et dans les pansements, de faire tenir la lumière derrière la tête du malade; enfin quoiqu'il n'y ait qu'un oeil malade, on fait couvrir celui qui est sain, et on prescrit le plus grand repos de la part des choses extérieures: Il y a même des cas, comme après l'opération de la cataracte par abaissement, où l'on ne permet pas au malade, surtout les premiers jours, de sortir du lit pour aller satisfaire à ses besoins.

On apperçoit assez l'indication du repos dans la cure des plaies et autres maladies qui affectent le visage & la bouche, sans qu'il soit besoin de nous y arrêter longtems. Nous dirons seulement que l'action de parler, de rire, de chanter, et la mastication seraient nuisibles dans ces différens cas. Nous ajouterons encore qu'outre le repos, la situation convenable est bien nécessaire dans les plaies du col. On a des exemples de plaies qui interrompoient la trachée artère presque entièrement coupée, et qui ont été guéries par le repos en général et par la seule attention de tenir la tête penchée en devant, le menton appuyé sur la partie supérieure de la poitrine.

Mais pour ce qui concerne la cure des plaies pénétrantes de la poitrine, compliquées d'épanchemens, ou de fracture des côtes &c.



l'indication du grand repos, et de la Situation en même tems, est de la dernière importance, puisque c'est en partie de ce procédé curatif, que dépend la guérison. Quant au repos en général, Il est certain que plus on calmera le mouvement du sang, plus il y aura de tranquillité & de douceur dans la respiration; moins les muscles de la poitrine agiront, et plus les côtes, si elles sont fracturées, seront dans l'état de repos qui convient à leur réunion.

Quant à la Situation, elle doit être telle qu'elle puisse favoriser la respiration; c'est donc en faisant ensorte, que le malade soit demi-assis dans le lit: par ce moyen la dilatation des poumons & l'élévation des côtes sont moins pénibles, surtout si la poitrine n'est pas surchargée par le poids des couvertures.

Telle est la Situation que les asthmatiques prennent dans le lit, par une sorte d'instinct. Ils s'y tiennent ordinairement demi-assis, la poitrine découverte, parceque la chaleur augmente l'accès; ils mettent un bras hors du lit, & appuient la main sur la cuisse, afin de pouvoir élever bien haut les épaules dans l'inspiration: ils évitent de se servir le ventre, afin qu'il puisse mieux céder aux mouvements du diaphragme.

Cette Situation n'est pas moins favorable pour faciliter la sortie des matières épanchées dans la poitrine, en observant de faire incliner davantage le blessé sur l'ouverture de la plaie, lorsqu'elle est située à la partie inférieure, comme après l'opération de l'empyème. Mais si l'ouverture de la plaie avait son siège à la partie supérieure, ~~il~~ ne faudrait pas trop compter sur le moyen de Situation; car l'inclinaison du corps sur la plaie, si elle avait son siège entre les premières côtes, ne réussirait pas dans ce cas-ci, et serait peut-être nuisible; puisque c'est sur le diaphragme que descend le liquide épanché, et qu'on est souvent obligé d'en venir à l'opération de l'empyème. Il y a cependant des auteurs qui conseillent — lorsque l'épanchement de sang dans la poitrine est la suite d'une plaie, avant que d'en venir à l'opération de l'empyème, de donner issue à ce fluide, en situant le malade de façon que la plaie soit la partie la plus déclive de la poitrine. L'autorité des grands maîtres de l'art engageait presque à prendre ce parti.

C'est avec le plus grand succès que Dionis, ayant trouvé toute la cavité de la poitrine pleine de sang à un homme, qui —
avait reçu

avait reçu un coup d'épée au thorax au dessous de la mamelle droite, dilata d'abord l'orifice de la plaie & fit coucher le malade toute la nuit sur la plaie; il trouva le lendemain matin que le sang était sorti de la cavité de la poitrine, & le blessé fut parfaitement guéri.

Ambroise Paré * fit mettre pareillement un homme blessé à la partie supérieure du thorax, dans une posture telle qu'il avait les pieds élevés et la tête basse; & ayant introduit le doigt dans l'orifice de la plaie, il en tira un grumeau de sang coagulé, qui le bouchait, fit sortir dans cette situation le sang épanché, et garantit le blessé d'une suffocation dont il était menacé.

L'indication du repos du corps & de la voix, n'est pas seulement nécessaire pendant le traitement, des plaies de poitrine, de l'hémoptisie & de la phtisie pulmonaire, &c; il est encore important d'observer le repos après leur guérison, pour prévenir les accidents consécutifs. —

Plin * * rapporte que Zozime son affranchi, fut attaqué d'une nouvelle hémorragie par les efforts qu'il faisait pour recouvrer la voix. Ainsi l'action de parler, de chanter, de crier, de jouer des instruments à vent, doit être évitée avec la plus scrupuleuse attention, longtemps après la guérison des différentes maladies de poitrine.

Les exercices qui mettraient violemment en action les bras, — seraient encore dangereux sur la fin de la cure de ces maladies; mais ils le seraient bien davantage pendant la cure du squirre & du cancer aux mamelles; l'agitation continuelle des muscles pectoraux ne manquerait pas d'exciter une irritation à la partie affectée et d'en augmenter les accidents. Il faut encore porter son attention pour éviter le frottement des habits, en couvrant la partie d'une peau douce.

De toutes les maladies chirurgicales un peu graves, qui attaquent l'abdomen, il n'y en a aucune, qui ne soit soumise à l'indication du repos & de la situation méthodique. Que l'on réfléchisse sur les accidents, qui accompagnent ordinairement les plaies pénétrantes de l'abdomen, compliquées d'épanchemens ou de l'issue des parties contenues; Il est aisé d'apprécier qu'il est de la dernière importance de mettre le malade dans le plus grand repos pour prévenir et calmer la violence des accidents, tels que l'hémorragie, l'agitation, l'insomnie, &c. &c. .

La situation méthodique est inséparable de l'indication du



parfait repos, soit pour faciliter l'issue des liquides épanchés en inclinant un peu le blessé sur l'ouverture de sa playe, soit pour occasionner la rentrée des parties contenues, après avoir mis les muscles du ^{bas} ventre dans le relâchement, en un mot le repos et la situation convenable sont indiqués pour assurer l'efficacité des autres moyens chirurgicaux.

Ces indications sont les mêmes pour la cure des différentes hernies — simples ou compliquées; mais le repos doit être observé, même, longtemps après la guérison. Il y aurait de l'imprudence de permettre aux hernétiques [nous demandons de l'indulgence pour cette expression] de s'exposer trop tôt à faire des efforts, de monter à cheval, de se livrer aux exercices de la voix; car les secousses & la pression des viscères, occasionnés par l'action du diaphragme que ces sortes d'exercices mettent ~~continuellement~~ continuellement en jeu, détruirait bientôt une cicatrice imparfaite, puisque dans l'état de santé, ils procurent des hernies.

Il suffit de se rappeler la structure des parties naturelles de la femme et de réfléchir un peu sur les faits de pratique, pour appercevoir que, dans les maladies qui affectent ces parties, telles que les chûtes de la matrice, du vagin, les ulcères, les hémorragies, &c, il est absolument nécessaire de satisfaire à l'indication du repos, même le plus parfait.

Voilà pourquoi, on a l'attention, dans les fausses couches & les pertes de tenir la malade couchée dans un lit plutôt dur que mollet, pour prévenir les mauvais effets de la trop grande chaleur du lit; ou sur une chaise longue qui ait beaucoup de fond, afin que les pieds de la malade ne puissent poser à terre; que non seulement on lui impose une immobilité presque totale, mais encore un silence absolu, et qu'on l'éloigne du bruit.

Les gens de l'art ont beau conseiller le plus grand repos, les gardes malades s'écartent toujours trop de ce qu'on leur a prescrit: on devrait entrer dans les plus petits détails à cet égard et faire sentir en même temps l'importance du plus grand repos. On devrait, par exemple, — recommander de faire prendre à la malade, les bouillons, &c, sans la soulever. Il faut, pour ainsi dire, la regarder comme une personne saignée à qui on ne ferait point de ligature: Pour que la veine piquée se reprenne, & que les lèvres de la plaie se réunissent, il faut que le bras soit en repos; à plus forte raison en faut-il pour la matrice, où le sang afflue par habitude & sans résistance: Il faut, de plus, que la malade se tienne couchée sur le dos, la matrice souffrant moins en cette situation, que si elle était couchée sur le côté; elle ne doit pas non plus se mettre sur son séant, parceque le diaphragme et

les muscles du bas ventre, donneraient des Secousses légères, à la —
 sévité, mais toujours nuisibles à la matrice: ainsi on ne saurait dans
 ces cas là, procurer à la malade une trop grande tranquillité, non
 seulement de corps, mais même d'esprit; car l'agitation de l'esprit
 sollicite les parties à des mouvements & à des contractions.

Cette indication du repos doit être la même, sans cependant être
 aussi stricte, pour les personnes Sujettes au pissement de sang —
 occasionné par le calcul des reins ou de la vessie; car elles ne peuvent
 se livrer à un exercice un peu violent, surtout si elles sont pléthoriques
 sans pisser du sang, quoiqu'elles ne ressentent aucune douleur dans
 les reins. Le mouvement de la voiture & l'action de parler, de
 chanter, &c, n'est pas moins préjudiciable dans ce cas là.

Sydenham * décide la question à cet égard, par son exemple;
 car lorsqu'il se promenait, qu'il allait en carrosse, ou qu'il parlait
 un peu longtemps, il urina le sang peu de temps après. En effet
 le mouvement de la voiture ne peut que rendre la vessie plus
 malade par l'action de la pierre sur ses membranes.

Il n'est personne, parmi les gens de l'art, qui n'ait remarqué que
 la promenade, l'exercice à cheval, et le mouvement d'une voiture —
 roulante sur le pavé, ne soit nuisible pendant la cure de la gonorrhée,
 et même après sa guérison. La compression, le frottement, et les
 Secousses, auxquelles les testicules, la verge & les parties voisines sont
 exposées pendant ces exercices, tendent à y exciter de la chaleur, * *
 des érections fréquentes, l'inflammation, la dysurie, la strangurie,
 le gonflement des testicules, l'augmentation de l'écoulement virulent,
 ou à le faire renaître après la guérison de la gonorrhée.

D'après cela on apperçoit assez l'indication du repos pendant
 et après la cure de cette maladie, et la nécessité de tenir les bourses
 soutenues par un bandage & la verge couchée sur le ventre.

Personne ne révoquera en doute que le repos du corps, celui de la —
 partie lésée & sa situation convenable ne soient une des principales
 indications curatives dans le traitement des plaies, des ulcères, des fractures,
 des luxations, &c, &c, qui attaquent les extrémités supérieures & inférieures:

* Vide Tractat. de mixtu cruento à calculo renibus impacto. Oper. Sydenh.

* * Equitantes assidue libidiniosiores evadere, quoniam genitalia continua
 attritione motioneque incalescentia spiritum concipiunt, sicque coeundi
 cupiditas inducitur. Hieronim. Mercurialis, de arte gymnasticâ.
 Cap. VIII

Et lorsque ces maladies sont accompagnées d'accidens, tels que la fièvre, le mal de tête, la douleur, l'insomnie, les convulsions, l'hémorragie, &c. C'est alors que le plus grand repos de la part des choses extérieures est indiqué, de même que dans les amputations; et qu'il doit être observé très scrupuleusement, jusqu'à ce que le tems de ces accidens soit passé.

Nous observerons cependant qu'il n'est pas nécessaire, et qu'il y aurait peut-être du danger, de faire observer le repos du corps, pendant tout le tems de la guérison des maladies des extrémités supérieures; Car on sait qu'elles sont en général moins fâcheuses que celles qui affectent les parties inférieures, supposant la lésion égale. On sentira aisément cette différence, si on fait attention que le retour du sang se fait plus facilement au bras qu'à la jambe; parceque celle-ci supporte le poids du corps, qu'elle a plus de longueur & de volume; au lieu que le bras peut être soutenu par l'écharpe, avantage que la jambe ne reçoit que du lit; outre le volume du sang qui y circule, la difficulté du retour de ce même sang l'oblige à remonter contre son propre poids.

Outre que le repos du corps est nécessaire jusqu'à la cessation des premiers accidens, et celui de la partie, jusqu'à la fin de la guérison des maladies des extrémités supérieures, on n'aurait pas encore satisfait à toutes les indications curatives du repos, si l'on n'avait pas égard à la situation convenable de la partie, d'autant plus que par la mauvaise situation d'un membre blessé, il peut survenir des accidens, & que souvent après la guérison, le membre demeure roide et retiré.

On sait que le pus le plus louable est susceptible de se corrompre par le séjour & la stagnation & qu'il dégénère quelquesfois en une sanie plus tenue & plus acre, d'où naissent les clapiers, les fusées, les sinus fistuleux, &c. Une écharpe mal mise, qui laisserait la main pendante, et qui ne la soutiendrait pas, de façon qu'elle fût un peu plus haute que le coude, donnerait lieu à l'engorgement oedémateux de la main. D'après cela, on sent bien la nécessité de la situation méthodique qu'il convient de donner, conjointement avec le repos, aux extrémités supérieures, lorsqu'il y a fracture, luxation, une plaie ou un ulcère, &c.

Supposons, par exemple, qu'un homme ait une fracture compliquée au bras, la réduction étant faite, et après avoir prescrit le repos du corps, & de la partie, la situation du membre blessé étant indispensable, elle devra être telle que l'avant bras se trouve à demi-fléchi, afin que les muscles se trouvent dans un parfait relâchement; qu'il soit plus élevé que le bras, & la main placée plus haut que le coude; et l'on devra remplir les vuides qui se trouvent dessous & à côté du bras, avec de la charpie, des compresses, &c; afin que toute l'extrémité soit soutenue mollement.

Mais si la fracture était aux environs de l'articulation, il y aurait à craindre que la matière de la suppuration, [si la partie blessée était —

Située sur la plaie,] trouvant de la résistance à couler au dehors, ne —
corrodât, par son séjour la coiffe ligamenteuse, et ne fusât dans l'articulation.
Il sera facile de prévenir cet accident, si l'on a l'attention de situer la partie
de façon à faire porter à faux l'endroit de la plaie pour en faciliter l'écoulement.

Lorsque le tems des premiers accidens sera passé, c'est alors que l'on pourra
permettre au malade de rester assis dans son lit, pour prévenir ou diminuer
la gêne de la situation horizontale de son corps; et lorsque l'état des forces
du blessé le permettront, il sera fort utile de le faire lever, ayant l'attention
de mettre le bras en écharpe & de faire en sorte qu'il soit à l'abri des grands
mouvements.

Ces indications sont les mêmes dans la cure de l'anévrisme faux du
bras, et quant à celle de l'anévrisme vrai, l'indication du repos en général,
mais surtout celui de la partie, longtemps continué, est de la dernière
importance. On en sent assez les raisons.

Examinons actuellement l'indication du repos particulier & de la
situation convenable dans le traitement des maladies chirurgicales
des extrémités inférieures.

Nous avons dit que les plaies, les luxations, & les fractures compliquées,
compliquées, &c. qui arrivaient à ces parties étaient beaucoup plus
fâcheuses, & que leur cure exigeait un plus long repos, que dans celle
des extrémités inférieures. Quant aux luxations & aux fractures, l'indication
curative étant de faire garder au blessé, le repos du corps, le plus —
parfait, pendant 40, 50, 60 jours, plus ou moins, pour rétablir les
désordres, qui suivent ordinairement les luxations complètes, tels que les
ligamens des articulations, qui, s'ils ne sont pas rompus, sont du moins très
allongés, & les muscles affaiblis par les tiraillemens qu'ils ont soufferts; et
pour donner le tems aux pièces fracturées de se souder entr'elles: Mais
comme il pourrait survenir des accidens par la mauvaise situation, je ne
dis pas seulement de la partie fracturée, mais même la situation du corps;
il est nécessaire d'y pourvoir, en lui donnant la situation la plus —
commode pour lui épargner la douleur & les mouvemens continuel
auxquels, une situation gênante l'exposerait. Quant à celle de la partie,
tout le monde sait qu'elle doit être placée également, sans porter à faux, et
dans une situation moyenne entre la flexion & l'extension, afin que
tous les muscles soient sans action, & qu'elle doit être un peu élevée du côté
du pied, pour favoriser le retour des liqueurs & prévenir le gonflement. *

* *Eligenda est situatio, quæ minimè sit dolorosa. Itaque modò in hanc,
modò in alteram partem collocanda est tibia, ut æger aliàs in hoc, aliàs
in alterum decumbere possit. Sic enim multa accidentia evitabuntur.*



Fabrie. hildanus. Cent. I. Obs. 93.

Quoique nous ayons prescrit le plus grand repos dans la cure de ces maladies; cependant il ne faudrait point trop abuser de cette règle; car en la suivant à la rigueur, les ligamens — pourraient acquérir une rigidité qui ne leur permettrait plus de s'étendre; ou la Sinovie en s'épaississant occasionnerait l'ankilose, d'où pourrait s'ensuivre la perte totale du mouvement des articulations. C'est pour éviter ces accidens que nous avons recommandé, en parlant du Changement de Situation, lorsque la douleur & l'inflammation sont passées, de faire faire quelques légers mouvemens à la partie, avec les précautions convenables.

La pluspart des malades, qui ont les jambes ou les cuisses fracturées, &c., ont après la coutume, pendant leur cure de s'asseoir dans le lit; nous croyons devoir observer qu'il est important de leur défendre cette Situation: parcequ'étant assis, ils ne peuvent s'empêcher de faire quelques mouvemens des bras, ceux-ci déterminent les mouvemens du tronc, et par succession, les muscles des extrémités inférieures entrent en contraction; ce qui peut dévanger les pièces fracturées, causer de la douleur; d'ailleurs cette Situation devient contraire à l'indication du parfait repos.

On néglige encore trop le repos dans la cure des entorses, même dans celles qui ne sont pas suivies dès l'instant de vives douleurs; d'où il arrive que les malades continuant à faire leurs fonctions, dérangent, par la marche, les articulations, en y attirant une plus vive inflammation; de sorte qu'ils rendent la maladie beaucoup plus grave, quelques fois même à un tel point qu'il faut six mois pour guérir une maladie — qui aurait disparu en six jours. Ainsi dès qu'on soupçonne qu'un tel dérangement des parties existe, si c'est au pied, le repos dans le lit est absolument nécessaire; si c'est au poignet, on doit faire porter le bras en écharpe.

Quoique nous n'ayons pas eu occasion de donner nos soins pour la rupture du tendon d'achille, nous pouvons cependant dire, d'après nos grands Maîtres, que ces blessés ne devraient pas marcher avant six semaines ou deux mois; encore faudrait-il qu'ils le fissent avec beaucoup de précautions: Celles que M. MONRO * a prises pour lui même dans l'accident de rupture du tendon d'achille, qui lui est arrivé, peuvent servir de modèle.

D'après ce que nous avons dit de l'indication du parfait repos & de la Situation de la partie, relativement aux fractures & aux luxations des extrémités inférieures, il est facile d'en faire l'application pour la cure des plaies, des ulcères, de l'inflammation, de l'œdème, &c., qui arrivent à ces mêmes parties. Celse * * fait assez sentir la nécessité du repos, dans ces cas là; la pratique en convainc tous les jours.

La Situation méthodique peut même être regardée comme un moyen aussi-curatif. On en jugera par cette observation assez connue, que Galien rapporte d'un jeune homme auquel il guérit un Sinus, dont le fond était à la partie

* Voyez le discours historique et critique sur le traité des maladies des os de feu M. Petit, par M. Louis.

* * Optimum etiam medicamentum quies est; Moveri & ambulare, nisi Sanis, alienum est. Minus tamen his est periculosum qui in capite vel brachiis, quam qui in inferioribus partibus vulnerati sunt; minimèque ambulatio convenit, femine, aut crura, aut pede laborante. Cels. lib. V. Sect. IX.

inférieure de la cuisse vers le genou, et l'orifice au dessus de la partie moyenne de la cuisse, en mettant seulement un coussin sous le jarret du malade, afin que l'aine fût plus basse que le genou.

Nous avons fait sentir plusieurs fois, que le retour du sang des extrémités inférieures se faisait plus difficilement qu'aux extrémités supérieures; que les plaies considérables, les ulcères, les fractures, &c. étaient ordinairement accompagnées de gonflement oedémateux, plus ou moins douloureux, près des malléoles, tant par la raison des mouvemens indispensables, auxquels les malades sont exposés, que par celle du poids du corps; & qu'enfin le sang y remonte par son propre poids et dans un éloignement bien considérable de la cause qui lui imprime son mouvement.

Pour se persuader davantage de la nécessité de satisfaire à l'indication du repos des parties blessées & de la situation convenable, et pour demeurer convaincu que le sang revient difficilement des parties inférieures, il suffit de se rappeler le mécanisme de la circulation du sang, lequel est porté du centre à la circonférence par les artères, & que ce sang est rapporté de la circonférence au centre par les veines.

Que les artères sont pourvues d'un mouvement qui comprime et fouette le sang pour le forcer de passer par degrés d'un tuyau large dans un infiniment plus petit; au lieu que les veines n'ont aucun mouvement apparent, et que d'un tuyau étroit, ce sang se porte dans un plus large, ce qui s'exécute depuis la plante des pieds jusqu'au coeur.

Le tuyau de la veine, petit et faible dans son principe, s'élargit par degrés, se coude d'espace en espace, et décharge le sang qu'il contient dans un tuyau plus large; dans son trajet il y a des brides ou valvules, qui s'opposent au retour du sang supérieur, et supportent son poids; au lieu que ces mêmes valvules se prêtent & se replient pour donner passage au sang inférieur, & ce mécanisme admirable s'exécute de même jusqu'au coeur.

On voit bien, d'après cela, que si le sang est gêné dans sa marche, la sérosité s'en séparera, transudera au travers des mailles des vaisseaux, s'infiltrera dans le corps graisseux, le tissu cellulaire, &c. et causera un gonflement oedémateux; et celui-ci gênera de plus en plus la marche du sang, et celui des muscles augmentera l'obstacle. C'est pourquoi il est important dans la cure des plaies, des ulcères, &c. des extrémités inférieures de prescrire non seulement le repos; mais encore de donner aux parties une situation convenable pour faciliter le retour du sang, en élevant le membre blessé, à la hauteur du niveau du corps.

Mais s'il y avait infiltration, alors il se présente une ~~contre~~

contr'indication



contre-indication, à laquelle on ne peut se dispenser de satisfaire en partie; car c'est une erreur assez vulgaire de la part de quelques personnes, qui conseillent encore à ceux dont les jambes sont hidropiques, de les tenir au niveau de leur Siège; ce qui est le vrai moyen de faire monter plus promptement l'humeur morbifique dans la cavité de l'abdomen & de l'y fixer.

Nous observerons à l'égard du traitement des grandes plaies, telles que celles qui sont la suite des amputations, que si l'on était absolument forcé, par des raisons particulières, d'employer l'émétique pour vider les premières voyes, il serait important de veiller au repos du membre amputé, pendant l'effet de l'émétique, dont les secousses violentes ~~pourra~~ pourraient détruire la ligature des vaisseaux, et causer par leur rupture une hémorragie très inquiétante. On prévoit assez que dans ce cas là, il est nécessaire de tenir le moignon ou le membre blessé, pendant l'action de l'émétique, afin d'empêcher que l'effet des secousses ne s'étendent jusques à la partie blessée.

Avant que de terminer, nous ferons encore remarquer la — nécessité de recommander à ces ouvriers, qui ont été obligés de garder le repos pendant le traitement de certaines maladies chirurgicales, de ne pas se remettre trop tôt à l'ouvrage, cause surtout dont le métier exige des situations & des mouvemens contraires au rétablissement des parties qui ont été lésées. C'est ainsi que les tailleurs & les ouvriers à l'aiguille qui auraient eu un anévrisme ~~vrai~~ au bras, devraient renoncer à l'action de coudre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à craindre; que les tisserands, qui ont eu des abcès ou des fistules à l'anus, ou qui ont été taillés, devraient attendre que les parties fussent bien consolidées, avant que de reprendre leurs travaux, & ainsi des autres.


J'ai vu un Tisserand auquel j'ai aidé à faire trois fois l'opération de la fistule à l'anus, dans l'espace de deux ans. Je suis persuadé qu'il devait ses deux dernières maladies à son travail qu'il reprenait trop tôt après sa guérison: Depuis il a été obligé d'y renoncer, et la fistule n'a plus reparu.

Que de choses encore à dire sur les indications du mouvement

et du repos, si nous ne craignons avec raison d'abuser de l'indulgence de nos juges, et de leur patience à nous lire! C'est un long Mémoire que le nôtre, il en faut convenir: Magna molis opus, Mais le Sujet, que l'Académie avait proposé, n'est-il pas immense en lui-même?

L'alternative de l'effleurer ou de le traiter dans toute son étendue, s'est présentée à nous en commençant cet ouvrage. Devant être jugés par des Maîtres, qui approfondissent tout, nous n'avons plus balancé, et nous nous sommes abandonnés sans crainte à toute l'étendue de notre Matière.

Heureux si la grandeur de notre Sujet et la Supériorité de nos modèles n'ont pas trahi notre faiblesse. Mais s'ils avaient pu devenir un piège pour nous, ils seront du moins une excuse, et l'excès de notre zèle achevera sans doute de décider notre grâce devant nos juges.



L'Académie Royale de Chirurgie
a proposé, pour le prix de l'année 1778
le Sujet suivant.

„ Exposer les effets du mouvement
„ & du repos, & les indications suivant
„ lesquelles on doit en prescrire l'usage
„ dans la cure des maladies Chirurgicales.


Tanta molis erat!
Virg.

Clement Joseph Tissot, Maître
ès arts en l'Université de Paris,
Docteur en Médecine résident
à Paris.


et du repos, si nous ne craignons avec raison d'abuser de l'indulgence de nos juges, et de leur patience à nous lire! C'est un long Mémoire que le nôtre, il en faut convenir: Magna molis opus, Mais le Sujet, que l'Académie avait proposé, n'est-il pas immense en lui-même?

L'alternative de l'effleurer ou de le traiter dans toute son étendue, s'est présentée à nous en commençant cet ouvrage. Devant être jugés par des Maîtres, qui approfondissent tout, nous n'avons plus balancé, et nous nous sommes abandonnés sans crainte à toute l'étendue de notre Matière.

Heureux si la grandeur de notre Sujet et la Supériorité de nos modèles n'ont pas trahi notre faiblesse. Mais s'ils avaient pu devenir un piège pour nous, ils seront du moins une excuse, et l'excès de notre zèle achevera sans doute de décider notre grâce devant nos juges.



Fin.



ou